

# FICHE TRANSPORTS SANITAIRES

## QUE FAIRE LORS DE TOUT TRANSPORT AMBULANCE ?

Appliquer les précautions standards

### PRÉREQUIS

Avant bras et mains dépouillés de bijoux

Ongles courts sans vernis ni résines

Port d'une tenue professionnelle

Cheveux attachés

Favoriser les manches courtes et faciles d'entretien

Vêtements hivernaux, veste coton ou polaire à changer toutes les 72h

Parka plastifiée pour favoriser un entretien intermédiaire en cas de contact direct avec le patient

1/ Hygiène des mains en priorité avec un produit hydro-alcoolique (PHA) avant et après contact avec le patient.

2/ En cas de risque d'exposition aux liquides biologiques, contact ou projections (sang, urines...)

- Port de gants à usage unique
- Friction avec PHA lors de la mise en place et du retrait des gants et les changer entre 2 soins. Porter également des gants en cas de mains lésées
- Port d'une surblouse ou tablier à usage unique

Les gants et la blouse sont à mettre seulement au moment du contact et à retirer tout de suite après

## Quels sont les produits et matériels indispensables à avoir dans le véhicule ?

• Produit hydro-alcoolique en flacons poche

• les chiffonnettes à privilégier pré-impregnées à utiliser pour les petites surfaces

• Détergent désinfectant de surfaces prêt à l'emploi spray de norme NF 14476

- Haricot à usage unique
- Sac vomitoire
- Crachoir à usage unique
- Urinal à usage unique
- Housse pour bassin



- Masques chirurgicaux
- Masques de type FFP2 (précautions Air, ex : tuberculose)
- Surblouses ou tabliers à usages uniques
- Gants à usage unique non stériles

• Papier absorbant • Sacs pour DASRI et sac pour DAOM • Contenant pour le linge


## Que faire entre deux transports ?

• **AÉRER LE VÉHICULE ENTRE DEUX TRANSFERTS**

• **REVÊTIR LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELS : EPI**

• **EFFECTUER UN BIONETTOYAGE**

- 1/ Se désinfecter les mains avec un PHA puis port des gants à usage unique
- 2/ Utiliser des chiffonnettes à usage unique ou essuie-tout
- 3/ Bien imbiber de produit la chiffonnette ou l'essuie tout
- 4/ Nettoyer désinfecter avec un détergent désinfectant pour surfaces en allant du plus propre au plus sale (brancard, couverture et toutes les zones de contact sans oublier les poignées du véhicule et le volant)



• **GÉRER DÉCHETS ET MATÉRIELS**

- Éliminer le linge souillé ou à usage unique dans un contenant prévu à cet effet
- Traiter le matériel souillé avec un détergent-désinfectant
- Éliminer les excréta dans la filière prévue à cet effet

## PATIENT SUSPECT OU PORTEUR D'UNE MALADIE TRANSMISSIBLE PAR CONTACT



Pour tout patient suspect ou porteur d'une maladie transmissible par contact liée à certains micro-organismes : infection à bactérie multirésistante (BMR), bactérie hautement résistante émergente (BHRe), diarrhée infectieuse, parasite



### Patients porteurs de BMR/BHRe

Appliquer les précautions standard + Les précautions complémentaires Contact

- Hygiène des mains en priorité avec un produit hydro-alcoolique (PHA) avant et après contact avec le patient
- Tablier ou surblouse en cas de contact rapproché avec le patient ou avec des liquides biologiques et à retirer après contact
- Port de gants à usage unique UNIQUEMENT si contact avec matières biologiques :
  - Réaliser une friction avec PHA lors de la mise en place et du retrait
  - Porter également des gants en cas de mains lésées

### Patient porteur de diarrhées infectieuses

Appliquer les précautions standard + Les précautions complémentaires Contact

- Réaliser une Hygiène des mains en priorité avec un produit hydro-alcoolique (PHA). Après le retrait des gants réaliser un lavage simple des mains (action mécanique pour éliminer les spores). Si pas de lavabo, réaliser une PHA
- Utiliser au maximum du matériel à usage unique
- Ou réaliser un nettoyage du matériel avec un produit détergent et désinfectant sporicide
- Ou un nettoyage complet (déterSION, rinçage) suivi d'une désinfection à l'eau de Javel à 0,5 % de chlore actif. (1 l d'eau de javel à 2.6% ou 1 berlingot à 9.6% de chlore actif pour un seau de 5l = 1 volume de chlore pour 4 volume d'eau)
- Rentrer à la base pour procéder au nettoyage et à la désinfection du véhicule
- Bionettoyage des surfaces avec un produit détergent et désinfectant sporicide (ex Oxyfloor®)
- Ou un nettoyage complet (déterSION, rinçage) suivi d'une désinfection avec la solution chlorée.

### Patient porteur de parasites (gale, poux, punaise de lit...)

Appliquer les précautions standard + Les précautions complémentaires Contact

- Mettre les EPI avant de prendre en charge le patient : surblouse à manches longues et gants/ à retirer après contact avec le patient
- Utiliser des draps à usage unique pour envelopper le patient
- Mettre une charlotte au patient (si poux)
- Utiliser au maximum du matériel à usage unique ou réaliser un nettoyage du matériel avec un produit détergent et désinfectant
- Après transfert du patient :
  - Retirer les EPI dans l'ordre indiqué (blouse puis gants), les mettre dans un sac à DASRI fermé immédiatement et l'éliminer
  - Réaliser une Hygiène des mains en priorité avec un produit hydro-alcoolique (PHA) après le retrait des gants puis réaliser un lavage simple des mains (action mécanique pour évacuer les parasites) puis réaliser une PHA.
  - Bionettoyage : réaliser un nettoyage des surfaces avec un produit détergent et désinfectant et si besoin utiliser un spray acaricide (en cas de gale profuse ou hyperkératosique)