ANTISEPSIE ET DÉSINFECTION CUTANÉE

7ème journée Prévention du Risque Infectieux en EHPAD 18 octobre 2018 - Angers 1. J'appuie sur le(s) numéro(s), selon mon(mes) choix



2. J'appuie sur OK pour valider mon(mes) choix





GÉNÉRALITÉSUN ANTISEPTIQUE...

- 1 Est un médicament (AMM)
- 2 Doit être utilisé systématiquement sur une peau lésée car favorise la cicatrisation
- 3 Nécessite obligatoirement d'avoir sous la main une prescription médicale ou un protocole pour être utilisé chez un résident
- 4 Ne génère pas d'apparition de résistance bactérienne contrairement aux antibiotiques

GÉNÉRALITÉS

UN ANTISEPTIQUE...

1 - Est un médicament (AMM)



2 - Doit être utilisé systématiquement sur une peau lésée car favorise la cicatrisation



3 - Nécessite obligatoirement d'avoir sous la main une prescription médicale ou un protocole pour être utilisé chez un résident



4 - Ne génère pas d'apparition de résistance bactérienne contrairement aux antibiotiques



L'ÉOSINE AQUEUSE 2% ...

- 1 Est un antiseptique mineur (spectre d'activité étroit)
- 2 Se conserve 1 mois après ouverture
- 3 Favorise l'assèchement des lésions cutanées
- 4 Doit être utilisé pour une irritation du siège au moment de la toilette.

L'ÉOSINE AQUEUSE 2% ...

1 - Est un antiseptique mineur (spectre d'activité étroit)



2 - Se conserve 1 mois après ouverture



3 - Favorise l'assèchement des lésions cutanées



4 - Doit être utilisé pour une irritation du siège au moment de la toilette.



Monsieur BRU est porteur d'une sonde vésicale à demeure :

1 - Je réalise une toilette au savon doux au moment de la toilette génito-anale

2 - Je réalise une toilette au savon doux après chaque selle

3 - J'applique du Dakin® sur le méat après la toilette pour le désinfecter

Monsieur BRU est porteur d'une sonde vésicale à demeure :

1 - Je réalise une toilette au savon doux au moment de la toilette génito-anale



2 - Je réalise une toilette au savon doux après chaque selle



3 - J'applique du Dakin® sur le méat après la toilette pour le désinfecter





MONSIEUR BRU EST PORTEUR D'UNE SONDE À DEMEURE : JE VIDANGE LA POCHE , JE MANIPULE LE LE ROBINET DE VIDANGE AVEC :

1 - Un antiseptique alcoolique

2 - Du Dakin stabilisé®

3 - Je ne désinfecte pas puisque je mets des gants

Monsieur BRU est porteur d'une sonde à demeure : JE VIDANGE LA POCHE, JE MANIPULE LE LE ROBINET DE VIDANGE AVEC :

1 - Un antiseptique alcoolique



2 - Du Dakin stabilisé®



3 - Je ne désinfecte pas puisque je mets des gants





JE DOIS POSER UN CATHETER SOUS-CUTANE :

1 - J'utilise exclusivement un antiseptique alcoolique type Bétadine® alcoolique, Chlorhexidine alcoolique pour désinfecter la peau

2 - Je peux utiliser du Dakin stabilisé®,

3 - Je peux utiliser un antiseptique aqueux type Bétadine® dermique.

JE DOIS POSER UN CATHETER SOUS-CUTANE:

 1 - J'utilise exclusivement un antiseptique alcoolique type Bétadine® alcoolique, Chlorhexidine alcoolique pour désinfecter la peau



2 - Je peux utiliser du Dakin stabilisé®,



3 - Je peux utiliser un antiseptique aqueux type Bétadine® dermique.





JE DOIS FAIRE UNE INJECTION SOUS-CUTANEE D'INSULINE :

- 1 Je dois 'utiliser systématiquement un antiseptique pour désinfecter la peau
- 2 Je peux utiliser de l'alcool à 60° ou 70° pour désinfecter la peau,
- 3 Je ne peux pas désinfecter la peau si elle est visuellement propre
- 4 Je dois sécher l'antiseptique excédentaire après respect du délai d'action du produit

JE DOIS FAIRE UNE INJECTION SOUS-CUTANEE D'INSULINE :

 1 – Je dois 'utiliser systématiquement un antiseptique pour désinfecter la peau



2 – Je peux utiliser de l'alcool à 60° ou 70° pour désinfecter la peau,



3 - Je ne peux pas désinfecter la peau si elle est visuellement propre



4 - Je dois sécher l'antiseptique excédentaire après respect du délai d'action du produit





LES DÉLAIS MOYENS DE CONSERVATION DES ATS APRÈS OUVERTURE SONT :

1 – Bétadine® alcoolique/ aqueuse : 1 mois,

2 - Chlorhexidine alcoolique incolore /aqueuse : 1 mois,

3 - Dakin stabilisé® : jusqu'à la date de péremption,

4 - Alcool modifié : jusqu'à ce que le flacon soit vide.

LES DÉLAIS MOYENS DE CONSERVATION DES ATS APRÈS OUVERTURE SONT :

```
1 mois,
1 – Bétadine® alcoolique/ aqueuse :
                              95%
2 - Chlorhexidine alcoolique incolore /aqueuse :
                                                         1 mois,
                          83%
3 - Dakin stabilisé®:
                        jusqu'à la date de péremption,
          20%
4 - Alcool modifié :
                        jusqu'à ce que le flacon soit vide.
             29%
```



UN RÉSIDENT EST ALLERGIQUE À L'IODE :

1 - Je peux utiliser de la Bétadine® qui est un antiseptique à base d'iode,

2 - Je choisis impérativement un autre antiseptique qui est un dérivé iodé.

UN RÉSIDENT EST ALLERGIQUE À L'IODE :

1 - Je peux utiliser de la Bétadine® qui est un antiseptique à base d'iode,



2 - Je choisis impérativement un autre antiseptique qui est un dérivé iodé.



68%



L'EAU OXYGÉNÉE À 10 VOLUMES (3%):

- 1 Est un antiseptique majeur (large spectre d'action),
- 2 Est hémostatique,
- 3 Présentée en flacon, se conserve 1 mois après ouverture,
- 4 Est utilisée diluée pour nettoyer une plaie.

L'EAU OXYGÉNÉE À 10 VOLUMES (3%):

1 - Est un antiseptique majeur (large spectre d'action),



2 - Est hémostatique,



3 - Présentée en flacon, se conserve 1 mois après ouverture,



4 - Est utilisée diluée pour nettoyer une plaie.





MADAME BUCHE EST TOMBÉE, ELLE A QUELQUES ÉRAFLURES AU GENOU DROIT, NE SOUFFRE PAS (VRAISEMBLABLEMENT RIEN DE CASSÉ!), SA VACCINATION ANTITÉTANIQUE EST À JOUR.

- 1 Je lave la plaie au savon antiseptique,
- 2 Je lave la plaie au savon doux,
- 3 Je rince le savon à l'eau du robinet,
- 4 Je sèche après rinçage,
- 5 J'utilise, ensuite pour désinfecter, les flacons d'antiseptiques entamés disponibles dans l'armoire à pharmacie du service, si la date de péremption inscrite sur le flacon n'est pas dépassée.

MADAME BUCHE EST TOMBÉE, ELLE A QUELQUES ÉRAFLURES AU GENOU DROIT, NE SOUFFRE PAS (VRAISEMBLABLEMENT RIEN DE CASSÉ!), SA VACCINATION ANTITÉTANIQUE EST À JOUR.

1 - Je lave la plaie au savon antiseptique,

6%

2 - Je lave la plaie au savon doux,

95%

3 - Je rince le savon à l'eau du robinet,

72%

4 - Je sèche après rinçage,

72%

5 - J'utilise, ensuite pour désinfecter, les flacons d'antiseptiques entamés disponibles dans l'armoire à pharmacie du service, si la date de péremption inscrite sur le flacon n'est pas dépassée.





LE DÉLAI POUR QU'UN ANTISEPTIQUE ALCOOLIQUE FASSE EFFET EST D'AU MINIMUM:

1 - 30 secondes,

2 - 45 secondes,

3 - 1 minute,

4 - > 1 minute.

LE DÉLAI POUR QU'UN ANTISEPTIQUE ALCOOLIQUE FASSE EFFET EST D'AU MINIMUM:

```
1 - 30 secondes,
                              76%
2 - 45 secondes,
         13%
3 - 1 minute,
        11%
4 - > 1 minute.
```



LE DÉLAI MOYEN POUR QU'UN ANTISEPTIQUE EN PHASE AQUEUSE FASSE EFFET EST D'ENVIRON :


1 - 30 secondes,

2 - 45 secondes,

3 - 1 minute,

4 - > 1 minute

LE DÉLAI MOYEN POUR QU'UN ANTISEPTIQUE EN PHASE AQUEUSE FASSE EFFET EST D'ENVIRON :



MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION