

Prévention du risque infectieux



Lors des TRANSPORTS SANITAIRES



Que faire lors de tout transport sanitaire ?

1. **Hygiène des mains** en priorité avec un produit hydro-alcoolique (PHA) avant et après contact avec le patient.
 2. **En cas de risque d'exposition aux liquides biologiques**, contact ou projections (sang, urines...)
 - Port de **gants à usage unique**. ⚠ Friction avec PHA lors de la mise en place et du retrait des gants et les changer entre 2 soins. Porter également des gants en cas de mains lésées.
 - Port d'une **surblouse à usage unique**.
- Les gants et le blouse sont à mettre seulement au moment du contact et à retirer tout de suite après



Déchets et matériels



Couches
Protections



Pansements,
compresses souillées

Que faire entre deux transports ?

- Eliminer le **linge** souillé ou à usage unique dans un contenant prévu à cet effet.
- Traiter le **matériel souillé** avec un détergent-désinfectant.
- Eliminer les **excrétas dans la filière** prévue à cet effet.

Bionettoyage



1. Se **désinfecter les mains** avec un PHA puis port des gants à usage unique.
 2. **Nettoyer désinfecter avec un détergent désinfectant** pour surfaces en allant du plus propre au plus sale (brancard, couverture et toutes les zones de contact sans oublier les poignées du véhicule et le volant).
- Pour un VSL :** les sièges ne peuvent pas être désinfectés, **nettoyer/désinfecter les zones touchées par les mains** du patient.

Quand porter un masque et pourquoi ?


Le port de masque chirurgical permet de :

- **Se protéger** : si le patient présente des signes respiratoires, lui faire porter le masque. Si il ne peut pas le porter ou le garder, portez le masque pour vous protéger.
- **Protéger les autres** : si vous êtes enrhumé ou si vous présentez des symptômes respiratoires de type toux ou expectoration → Port de masque systématique.



Que faire si un patient a une BMR ou BHRé ?

BMR: bactérie multirésistante aux antibiotiques, BHRé: bactérie hautement résistante aux antibiotiques



- Appliquer les **précautions standard** comme pour tout transport.
- Tablier ou surblouse en cas de contact rapproché avec le patient
- La notion de bactéries multi ou hautement résistantes aux antibiotiques (BMR/BHRé) **ne constitue pas un critère de choix du véhicule**.

Quels sont les produits indispensables à avoir dans le véhicule ?

- **Produit hydro-alcoolique** en flacons poche
- **Détergent désinfectant** de surfaces prêt à l'emploi (spray ou lingettes pré-imprégnées)
- Housse pour bassin - Haricot à usage unique - Sac vomitoire - Crachoir à usage unique - Urinal à usage unique
- **Papier absorbant** - **Sacs** pour DASRI et sac pour DAOM - Contenant pour le linge
- **Masques** de type FFP2 (précautions Air, ex: tuberculose) - **Masques** chirurgicaux - **Surblouses** à usage unique - **Gants** à usage unique non stériles

DASRI: déchet d'activité de soins à risque infectieux; DAOM: Déchet assimilés aux ordures ménagères