

Précautions complémentaires "CONTACT"

Prévenir la transmission par les mains et l'environnement

Appliquer les précautions standard

Sols et surfaces

- Entretien **quotidien** avec les produits habituels

Gestion des excréta

- Privilégier lave bassin ou sac protecteur à usage unique
- Elimination des protections d'incontinence et des sacs protecteurs :
 - dans les **DASRI** en cas de diarrhée infectieuse
 - dans les **DAS** pour les BMR et BHR

Matériel de soins

- Individualisé si possible (brassard à TA, etc.)
- Essuyage humide avec un détergent/désinfectant après chaque utilisation
- Pas de stock de consommables dans la chambre
- Ne pas jeter le matériel non utilisé

Hygiène des mains

- Friction hydro-alcoolique **systématiquement** avant et après tout contact avec le résident et son environnement

Protection de la tenue

- Si **contact rapproché** avec le résident et son environnement
- A éliminer immédiatement après le soin (DAS)



Précautions "CONTACT" SPÉCIFIQUES G

Prévenir la transmission par les mains et l'environnement

Sols et surfaces

- Entretien quotidien de l'environnement du résident y compris chevet et placards avec les produits habituels

Linge

Elimination :

- Se référer à la procédure spécifique de l'établissement, identifier le sac : "gale + date de conditionnement"
- Linge à 60°
- Linge fragile :
mettre dans un sac plastique
→ Pulvérisation avec un produit acaricide
→ Ou isolement dans un sac fermé pendant 3 jours puis lavage habituel

Matériel de soins

- Individualisé si possible (brassard à TA, etc.)
- Essuyage humide avec un détergent/désinfectant après chaque utilisation
- Pas de stock de consommables dans la chambre

Appliquer les précautions standard

Chambre seule **OBLIGATOIRE**

Maintien des précautions jusqu'à 48 h après traitement



Hygiène des mains

- Friction hydro-alcoolique dès l'entrée dans la chambre
- Avant de sortir de la chambre, lavage à l'eau et au savon, puis friction hydro-alcoolique

Equipement de protection

Si contact cutané, linge et literie

- Surblouse manches longues à usage unique
- Gants : Recouvrir les manches de la surblouse
1 soin = 1 paire de gants

A éliminer avant de sortir de la chambre (DASRI)

Précautions "CONTACT" SPÉCIFIQUES ICD

Prévenir la transmission par les mains et l'environnement

Appliquer les précautions standard

Chambre seule **OBLIGATOIRE**

Maintien des précautions jusqu'à 48 h
après la disparition des signes cliniques

Sols et surfaces

- Entretien quotidien et dès que souillé avec un détergent désinfectant **sporicide OU** nettoyage avec un détergent neutre, rinçage à l'eau puis désinfection à l'eau de Javel 0,5% de chlore actif : 200 ml d'eau de javel à 2,6% et 800 ml d'eau = 1 l à 0,5% (stable 24 h)

Gestion des excréta

- Lave bassin ou sac protecteur à usage unique
- Elimination des protections d'incontinence et des sacs protecteurs dans les DASRI

Matériel de soins

- Individualisé si possible (brassard à TA, etc.)
- Essuyage humide avec un détergent/désinfectant sporicide après chaque utilisation
- Pas de stock de consommables dans la chambre



Hygiène des mains

Friction hydro-alcoolique dès l'entrée dans la chambre

- Avant de sortir de la chambre, lavage à l'eau et au savon, puis friction hydro-alcoolique

Equipement de protection

Si contact cutané, linge et literie

- Surblouse manches longues à usage unique



- Gants : Recouvrir les manches de la surblouse
1 soin = 1 paire de gants

A éliminer avant de sortir de la chambre
(DASRI)

Précautions complémentaires "GOUTTELETTES"

Prévenir la transmission par les projections : toux, éternuement ...

Appliquer les précautions standard

Sols et surfaces

- Entretien **quotidien** avec les produits habituels

Matériel de soins

- Individualisé si possible (brassard à TA, etc.)
- Essuyage humide avec un détergent/désinfectant après chaque utilisation
- Pas de stock de consommables dans la chambre

Protection de la tenue

- Si **contact rapproché** avec le résident et son environnement
- A éliminer immédiatement après le soin (DAS)

Hygiène des mains

Friction hydro-alcoolique **systématiquement** avant et après tout contact avec le résident et son environnement

Masque chirurgical

- Dès l'**entrée** dans la chambre (élimination DAS)

Masque FFP2

- Dès l'**entrée** dans la chambre pour toute manœuvre respiratoire, invasive (kiné respiratoire, prélèvement nasal, aspirations)

Lunettes de protection

- En cas de risque de projections



Précautions complémentaires "AIR"

Prévenir la transmission aéroportée

Appliquer les précautions standard
Chambre seule **OBLIGATOIRE**
MAINTENIR LA PORTE FERMÉE



Sols et surfaces

- Entretien quotidien avec les produits habituels
- Aération pluriquotidienne

Matériel de soins

- Individualisé si possible (brassard à TA, etc.)
- Essuyage humide avec un détergent/désinfectant après chaque utilisation
- Pas de stock de consommables dans la chambre

Hygiène des mains

Friction hydro-alcoolique **systématiquement** avant et après tout contact avec le résident et son environnement

Masque FFP2

- A mettre avant d'entrer dans la chambre
- A enlever après être sorti et avoir refermé la porte
- A éliminer dans les DAS

Protection de la tenue

- Si contact rapproché avec le résident et son environnement
- A éliminer immédiatement après le soin (DAS)

