

Jeudi
7 février
2019

CHAMBRE
DE COMMERCE
CENTRE DES SALORGES
NANTES

Actualités nationales

Didier LEPELLETIER

*Unité de Gestion du Risque Infectieux, Service de Bactériologie –
Hygiène Hospitalière
Université de Nantes, Laboratoire de recherche MiHAR, Faculté de
Médecine www.mihar.univ-nantes.fr*



Actualités forcément partielles et orientées

**N'abordant pas la coordination et les missions
des CPIAS sur le territoire national**



CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANTES

Actualité nationale

Société Française d'Hygiène Hospitalière





ÉDITO /
« Hawthorne effect »
Par Pierre Parneix

NOUVEAU GUIDE
Hygiène des mains
→ TÉLÉCHARGER

SF2H
Risque infectieux et soins
30^{ÈME}
CONGRÈS

DU 5 AU 7 JUIN 2019
À STRASBOURG

→ PARTICIPER

TRAVAUX ET PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES



Soumission de résumés (Terminée depuis le 30/01)

Bourse Recherche en SI (Surveiller l'AO)

Les 4 grands thèmes retenus pour 2019 sont :

- « Big data » et risque infectieux
- Cathéters périphériques vasculaires et sous cutanés
- Microbiote intestinal et IAS
- Les Epidémies et leur impact

LE GERES ENQUÊTE SUR LES APPAREILS DE PROTECTION RESPIRATOIRE



DÉCEMBRE 2018

Au décours de la publication de notre avis sur les masques de protection respiratoire, notre partenariat avec l'INRS et le GERES autour de ces sujets de prévention majeurs continue.

Nous sommes partenaires de l'enquête du GERES qui visent à avoir une connaissance la plus exhaustive possible des modèles d'APR de type FFP, disponibles dans les établissements de santé et permettra de :

- compléter la liste des modèles d'APR pour les établissements de santé dans la base de données matériels de protection du GERES,
- réaliser une étude comparative des méthodes d'évaluation de l'ajustement de ces APR.

[Accéder à l'enquête du GERES](#)



**Société Française
d'Hygiène Hospitalière**

AVIS N° 2018-01/SF2H du 23 mars 2018

**relatif au choix et à l'utilisation adaptée d'un
appareil de protection respiratoire**

La SF2H a été saisie suite à la survenue d'un cas de tuberculose ultra-résistante (XDR) nosocomiale [1]. Le choix d'un appareil de protection respiratoire (APR) de type pièce faciale filtrante (FFP) ainsi que son utilisation adaptée ont été interrogés à cette occasion. Ces APR sont indiqués systématiquement dans le cadre des précautions « air ». Ils sont également indiqués dans le cadre des précautions complémentaires « gouttelettes » pour des situations générant un risque d'aérosolisation des virus grippaux [2,3].

Cet avis apporte des précisions techniques sur les conditions de choix d'un APR et de son utilisation adaptée.

Considérant que :

Journal of Hospital Infection

What do we know about good practices in respiratory infection control to wear a filtering facial piece (FFP) Mask correctly ? The French Society for Hospital Hygiene point of view
--Manuscript Draft--

Manuscript Number:	JHI-D-19-00079
Full Title:	What do we know about good practices in respiratory infection control to wear a filtering facial piece (FFP) Mask correctly ? The French Society for Hospital Hygiene point of view
Corresponding Author:	Didier Lepelletier, M.D., Ph.D. Centre Hospitalier Universitaire de Nantes NANTES, FRANCE

Guides de recommandations publiés en 2018



Les situations professionnelles retenues et leurs savoir-agir correspondants

- SA 1 : Gérer une épidémie d'infections associées aux soins (IAS)
- SA 2 : Traiter un signalement de colonisation ou d'IAS
- SA 3 : Réaliser une surveillance épidémiologique des IAS
- SA 4 : Elaborer, promouvoir et accompagner la mise en oeuvre d'un référentiel des mesures de prévention des IAS
- SA 5 : Elaborer et conduire un programme de prévention des IAS intégrant la maîtrise de l'antibiorésistance
- SA 6 : Réaliser l'évaluation d'une pratique de soins
- SA 7 : Elaborer et conduire un plan de prévention des risques infectieux liés à l'environnement : air, eau, surfaces
- SA 8 : Conseiller les décideurs pour prendre en compte le risque infectieux pour tout projet de construction, d'aménagement ou d'équipement
- SA 9 : Concevoir et conduire des activités de formation continue dans le domaine de la gestion du risque infectieux pour les professionnels de santé

Les ressources nécessaires aux divers savoir-agir

- Connaissances scientifiques : « Connaître »
- Connaissances méthodologiques et techniques : « Connaître »
- Connaissances sur le contexte de travail « Connaître »
- Savoir-faire méthodologiques et techniques : « Etre capable de »
- Savoir-faire méthodologiques de management et de gestion : « Etre capable de »
- Savoir-faire relationnels : « Etre capable de »


Guides de recommandations publiés en 2018



RECOMMANDATIONS / PLACE DE LA SURVEILLANCE MICROBIOLOGIQUE DE L'ENVIRONNEMENT DANS LA PRÉVENTION DES INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS – DÉCEMBRE 2018

Plus de 15 ans après les recommandations de 2002 surveillance microbiologique de l'environnement dans les établissements de santé – Air eaux et surfaces et deux [...]

janvier 2019



Guides en cours de finalisation 2019




PREVENTION DES INFECTIONS LIEES AUX CATHETERS
PERIPHERIQUES VASCULAIRES ET SOUS-CUTANES

(DOCUMENT DE TRAVAIL FEVRIER 2019)

Société Française d'Hygiène Hospitalière (SF2H)

PREVENTION DU RISQUE INFECTIEUX LIE À
L'UTILISATION DE CVC POUR NUTRITION
PARENTERALE EN NEONATOLOGIE


Août 2018.



Actualité nationale
Santé Publique France



Figure 1: Taux de consultations pour syndrome grippal pour 100 000 habitants en métropole : saisons 2016-17, 2017-18 et 2018-19



Source : Données Sentinelles

Figure 2 : Niveau d'alerte régional en semaine 04/2019







Figure 3 : Évolution hebdomadaire des taux de consultations pour syndrome grippal : pourcentage parmi les actes (SOS Médecins) et taux de consultations pour 100 000 habitants (Sentinelles), semaines 40/2014 à 04/2019*, France métropolitaine



**Données provisoires sur les 2 dernières semaines*

Figure 4 : Évolution hebdomadaire des hospitalisations pour grippe : nombre de cas graves admis en réanimation (SpFrance) et part de la grippe pour 1 000 hospitalisations (Oscour®) par semaine d'admission, semaines 40/2014 à 04/2019*, France métropolitaine



**Données provisoires sur les 2 dernières semaines*

Actualité nationale « Vaccination »
Société française de Gériatrie Gérontologie





Mooc « Maladies à prévention vaccinale chez le sénior »

par caropasto@gmail.com / Samedi 1 décembre 2018

La campagne de vaccination contre la grippe vise à protéger le plus grand nombre, notamment les personnes les plus fragiles, qui vivent avec une ou plusieurs maladies chroniques, les personnes vieillissantes.

Ce MOOC "[Maladie prévention vaccinale chez le sénior](#)" a été créé pour les professionnels de santé et tous ceux qui veulent se mettre à jour sur les maladies et les vaccins qui concernent les personnes âgées et vieillissante.

Inscription dès le 14 janvier 2019 : <https://eformation.univ-grenoble-alpes.fr/>



La SFGG, en partenariat avec la SPILF, a créé un Mooc intitulé « Maladies à prévention vaccinale chez le sénior » associant les meilleurs experts francophones du sujet avec beaucoup de vidéos.

Cela représente 25 à 40 minutes de temps par semaine pendant 8 semaines (dont semaine « 5 » : évaluation et enquête de 5 minutes).

Les inscriptions sont encore possibles **jusqu'au 14 février 2019**.

Le Mooc est gratuit si vous le faites pour votre culture personnelle ou validant DPC avec un coût associé.

Actualité nationale « Indicateurs »
Haute Autorité de Santé



HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ

IQSS 2019 - ISO-ORTHO : Infections du site opératoire après pose de prothèse de hanche ou de genou



Développement d'un indicateur de résultats en orthopédie

07.11.2016

ORTHOPÉDIE & TRAUMATOLOGIE

Mots clés : Articulations et rhumatismes

Chirurgie orthopédique et traumatologique Indicateurs

La méthode utilisée pour la validation de la détection des ISO dans le PMSI fait l'objet d'un rapport d'expérimentation (CPIAS IDF, 2018), avec notamment l'utilisation d'un algorithme dont la valeur prédictive positive est de 87% (Grammatico-Guillon et al. 2014).

Développement de l'indicateur de résultats : « taux d'infections du site opératoire (ISO) après pose de prothèse totale de hanche ou de genou »

https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2806593/fr/iqss-2019-iso-ortho-infections-du-site-operatoire-apres-pose-de-prothese-de-hanche-ou-de-genou

Mesure des infections du site opératoire 3 mois après pose de prothèse totale de hanche (hors fracture) ou de genou (ISO-ORTHO)

Octobre 2018

Un indicateur national de résultat en chirurgie orthopédique est proposé aux professionnels de santé. Il mesure les **infections du site opératoire (ISO)** 3 mois après pose de prothèse totale de hanche (hors fracture) ou de genou, à partir des données du programme médicalisé des systèmes d'information (PMSI MCO). Le développement de cette mesure s'inscrit dans la politique nationale des indicateurs de qualité et sécurité des soins (IQSS) en établissements de santé.

Pourquoi cet indicateur ?

La survenue d'une ISO :

- est un événement indésirable grave impactant le patient en matière de : durée de séjour, qualité de vie, incapacité, réhospitalisation, reprise, etc. et pouvant mettre en jeu le pronostic vital ;
- est associée à un risque relativement faible (< 2 %) mais concerne une chirurgie fréquente (200 000 patients/



Indicateur de sécurité du patient

« Infection du site opératoire 3 mois après la pose d'une prothèse totale de hanche (hors fracture) ou de genou »

ISO-ORTHO

Fiche descriptive 2018

Définition	Cet indicateur mesure les infections du site opératoire (ISO), codées dans le programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI) dans les 3 mois suivant la pose d'une prothèse totale de la hanche (PTH) hors fracture ou du genou (PTG) chez l'adulte.
------------	---

Indicateur de sécurité du patient en chirurgie orthopédique « Infection du site opératoire 3 mois après pose de prothèse totale de hanche (hors fracture) ou de genou »


Guide de lecture du funnel plot

L'indicateur est calculé pour chaque établissement de santé sous forme d'un ratio standardisé :

$$\text{Ratio standardisé}^1 = \frac{\text{nombre d'événements observé}}{\text{nombre d'événements attendu}}$$

L'indicateur est restitué à chaque établissement de santé dans un funnel plot (diagramme en entonnoir). Il s'agit d'une représentation graphique caractérisée par 4 paramètres :

Illustration des 3 situations possibles d'un établissement de santé dans un funnel plot



atih

AGENCE TECHNIQUE
DE L'INFORMATION
SUR L'HOSPITALISATION

Accès aux applications de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation

QualHAS



QUALHAS

Plate-forme de recueil des indicateurs de qualité au sein des établissements de santé en France en partenariat avec la HAS.

Ce recueil est quasiment exhaustif, tous les établissements dépassant le seuil d'éligibilité en terme de nombre de patients, sur les 4 champs du PMSI : MCO, SSR, HAD et Psychiatrie.

Un logiciel de tirage au sort (Lotas) spécifique à chaque thème et à chaque champ réalise des tirages au sort à partir des données transmises et validées sur e-PMSI. L'échantillon ainsi défini est transmis à la plate-forme Qualhas qui génère automatiquement des formulaires de saisie partiellement pré-remplis. Les établissements de santé complètent ces formulaires. Les résultats des différents indicateurs sont calculés sous forme de tableaux et de graphiques, diffusés aux établissements, ARS et la HAS.

Vous avez un compte Pasrel (Plage)

Identifiant :

Mot de passe:

SE CONNECTER

EFFACER

[Vous avez oublié votre mot de passe](#)


[Vous ne connaissez pas votre identifiant](#)


[Regroupement de compte](#)

Pour les EOH qui souhaiteraient avoir un accès direct à la plateforme QualHAS vous pouvez faire une demande de création de compte PLAGE. Celle-ci sera soumise à la validation du référent QualHAS de votre établissement.

Actualité internationale/nationale

Antibio-résistance





FRENCH



⋮ French



Don't Leave It Halfway - The birthday party (French) | 00:52



Don't Leave It Halfway - Animal Lovers (French) | 00:53



Don't Leave It Halfway - The car and the old woman (French) | 01:03



Don't Leave It Halfway - The concert (French) | 00:45

Parmi les nouveaux outils proposés sur le sujet pour le grand public EU JAMAI propose une série de vidéos intitulée « Don't live it halfway » avec une version française.

Gestion des risques

Céline Pulcini devient chef de projet national à l'antibiorésistance

29/01/19 - 16h38



La stratégie de lutte contre l'antibiorésistance en France est désormais pilotée par **Céline Pulcini**. Cette dernière est nommée chef de projet national à l'antibiorésistance par Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Elle succède à Christian Brun-Buisson, délégué ministériel à l'antibiorésistance dont la mission s'est achevée en novembre 2018. Céline Pulcini "veillera à la mise en œuvre effective des mesures adoptées afin que la France puisse atteindre l'objectif de réduction...

Actualité nationale

Haut Conseil de la Santé Publique



adsp

Enquête lectorat 2019

Répondez jusqu'au 15 mars

Dernières mises en ligne

[Available english versions](#)

dossier **adsp**

Santé des personnes sous main de justice

240 000 personnes relèvent des services de la justice, dont 70 000 en détention, cumulant inégalités sociales et état de santé préoccupant. Si la prise en charge sanitaire s'est améliorée, la détention rend compliqués l'organisation des soins et l'accès à la prévention.



[Lire la suite](#)

à la une

Projet de Stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens

Le HCSP formule un avis relatif au projet de la deuxième Stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens. Il propose des objectifs de résultats et des indicateurs pour les actions associées à chacun des axes de la nouvelle stratégie.

Ce rapport s'inscrit dans la perspective de faciliter le suivi de la mise en œuvre des actions de la deuxième Stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens et fournir les repères qui permettront de porter un jugement sur sa performance.

[Lire la suite](#)

Projet d'indicateur global de la qualité de l'eau de consommation

Le HCSP formule un avis dans le cadre du projet d'indicateur de la qualité de l'eau de consommation. Il émet des recommandations spécifiques pour le calcul de l'indicateur, sa diffusion et sa compréhension par les consommateurs.

[Lire la suite](#)

Cas groupés d'infections à *Kingella kingae* en collectivités d'enfants

La bactérie *Kingella kingae* est la principale cause d'infections ostéo-articulaires chez les enfants âgés de 6 mois à 4 ans. Le HCSP propose une conduite à tenir lors de la survenue de cas groupés d'infections dans une collectivité d'enfants.

[Lire la suite](#)


Prévention de l'infection à cytomégalovirus chez la femme enceinte

Le cytomégalovirus (ou CMV) est responsable d'infections passant souvent inaperçues, mais chez la femme enceinte il peut provoquer des lésions du fœtus. Le HCSP actualise les recommandations de prévention de l'infection chez la femme enceinte.

[Lire la suite](#)

Saisines de la DGS/DGOS en cours

- Indication des contre-mesures non pharmaceutiques pertinentes pour limiter la diffusion des maladies infectieuses
- Mesures de prise en charge de patient infecté ou colonisé par *Candida auris* et au bénéfice-risque d'une prescription d'antifongiques en prophylaxie
- Actualisation des recommandations relatives à la maîtrise de la diffusion des bactéries hautement résistantes aux antibiotiques émergentes (BHRe)



Méthodologie

Identification de fiches pragmatiques avec recommandations

Identification de fiches pragmatiques de CAT (Fiches 1 à 11)

- Quels patients à risque de portage faut-il dépister ?
- Quelles sont les méthodes microbiologiques de diagnostic et leurs indications ?
- Comment évaluer le risque de diffusion ?
- Quelle est la place du cohorting et des unités dédiées ?
- Comment organiser le transport des patients BHRe ?
- Quelle stratégie de surveillance des patients BHRe et de leurs contacts
- Comment signaler et communiquer ?
- Quelle stratégie d'antibiothérapie mettre en place dans un service à l'occasion de la prise en charge d'un ou plusieurs patients ?
- Quel repérage informatique ?
- Quelles sont les dimensions éthiques et les pertes de chance ?
- Quels indicateurs pour les études médico-économiques ?

Tenant compte de la revue de la littérature et de la webographie

Et en s'appuyant sur une analyse de risque

Avis et rapports du HCSP

Toutes les années (12)

Toutes les langues (2)

Tous les supports (7)

Tous les domaines (13)

Saisissez du texte pour filtrer sur tous les textes du résultat

654 documents

Date	Support	Titre
20/11/2018	Rapport	Analyse critique du projet de Stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens 2 (SNPE2) et proposition d'indicateurs de résultats
20/11/2018	Rapport	Critical analysis of the draft National Strategy on Endocrine Disruptors 2 (SNPE2) and proposal of result indicators
14/11/2018	Avis	Avis relatif à un projet d'indicateur global de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine
10/10/2018	Programme de séminaire	Séminaire Priorité prévention, passons à l'acte ! du 10 octobre 2018
10/10/2018	Note	Séminaire Priorité prévention, passons à l'acte ! du 10 octobre 2018
07/09/2018	Rapport	Gestion d'épisodes de cas groupés d'infections invasives à <i>Kingella kingae</i> en collectivités d'enfants
07/09/2018	Avis	Gestion d'épisodes de cas groupés d'infections invasives à <i>Kingella kingae</i> en collectivités d'enfants
07/09/2018	Avis	Avis relatif aux indications en prophylaxie et en curatif des antiviraux et des anticorps monoclonaux chez les professionnels de santé exposés au virus Ebola
03/07/2018	Avis	Avis relatif à l'évolution des messages sanitaires apposés sur les actions de promotion des acteurs économiques dans le cadre du PNNS 4
22/06/2018	Avis	Avis relatif aux mesures préventives par la vaccination contre le virus Ebola des personnes susceptibles d'être en contact avec des patients à risque de transmission
22/06/2018	Avis	Élaboration de recommandations pour autoriser le lâcher de moustiques stériles à des fins de lutte anti-vectorielle
14/06/2018	Rapport	Avis relatif à la place des offreurs de soins dans la prévention
14/06/2018	Avis	Avis relatif à la place des offreurs de soins dans la prévention
14/06/2018	Communiqué de presse	Avis relatif à la place des offreurs de soins dans la prévention
14/06/2018	Annexe	Avis relatif à la place des offreurs de soins dans la prévention
08/06/2018	Avis	Avis relatif à la définition de mesures de gestion concernant l'exposition des populations antillaises à de l'ammoniac (NH3) et du sulfure d'hydrogène (H2S) issus de la décomposition d'algues Sargasses
18/05/2018	Avis	Relatif à la détermination d'un seuil pratique pour définir un pays de haute endémicité tuberculeuse
18/05/2018	Avis	Relatif à la mise en place d'une déclaration obligatoire des infections à MERS-CoV
18/05/2018	Avis	Relatif aux modalités d'utilisation de la primaquine dans le traitement radical du paludisme à <i>Plasmodium vivax</i> et <i>Plasmodium ovale</i> en France

