



Critères d'orientation Tiac ou GEA

Critères	GEA	Tiac
Agents	Norovirus et parfois rotavirus	Agents variés dont norovirus en période hivernale
Diffusion temps / espace	Diffusion progressive	Survenue rapide des cas (de quelques heures à 72h selon l'agent en cause)
Transmission-interhumaine secondaire	Transmission inter-humaine par contagion	Possible transmission inter-humaine à la suite d'une Tiac
Profil de la courbe épidémique (exemple en Ehpad)		
Personnes malades	Résidents et membres du personnel	Résidents +++ Membres du personnel malade : - si partage d'un repas commun avec les résidents - secondairement par transmission inter-humaine (Tiac à norovirus par exemple)
Clinique	Vomissements (>50%) et/ou diarrhées sans fièvre	Vomissements et/ou diarrhées, avec ou sans fièvre selon le germe
Ampleur jugée par un taux d'attaque (TA)* chez les résidents au cours des 2 à 3 premiers jours de l'épidémie	Pour Ehpad ≥ 80 places : Si TA ≤ 15% Pour Ehpad < 80 places : Si TA ≤ 20%	Pour Ehpad ≥ 80 places : Si TA > 15% Pour Ehpad < 80 places : Si TA > 20%
Conduite à tenir	Mise en place de mesures barrières précoces Signalement ARS (surveillance GEA en Ehpad)	Signalement à l'ARS pour une investigation complémentaire rapide Coproculture impérative si malade fébrile (Salmonelles, <i>Campylobacter</i> , <i>Yersinia</i>) Une étiologie virale pourrait être recherchée dans un 2 ^{ème} temps.

* TA = Nombre de nouveau cas chez les résidents / population totale des résidents de l'Ehpad