


# Quizz relatif aux Précautions standard



1-J'appuie sur le(s)  
numéro(s),selon  
mon(mes) choix



2-J'appuie sur **C** si  
je veux annuler  
mon vote




3-J'appuie sur **OK**  
pour valider mon(mes)  
choix



**I. Un patient/résident vient d'être transféré en urgence suite à une hémorragie digestive massive .**

- 1) Le pied à perfusion étant souillé de sang ,vous portez des gants non stériles à usage unique pour faire uniquement un essuyage rapide avec une chiffonnette sèche
- 2) Vous éliminez les draps du lit souillés de sang suivant le circuit habituel du linge sale de l'établissement
- 3) Vous réalisez le bio-nettoyage de cette chambre avec un détergent-désinfectant habituel

**Un patient/résident vient d'être transféré en urgence suite à une hémorragie digestive massive .**



## Gestion de l'environnement



R29

Manipuler avec des équipements de protection individuelle adaptés tout matériel (dispositif médical, linge, déchet...) visiblement souillé ou potentiellement contaminé par du sang ou tout autre produit biologique d'origine humaine.



Matériel ou dispositif médical réutilisable :


- avant utilisation, vérifier que le matériel a subi une procédure d'entretien appropriée au niveau requis (non critique, semi-critique, critique),
- après utilisation, nettoyer et/ou désinfecter le matériel avec une procédure appropriée.

R30



R31

Procéder au nettoyage et/ou à la désinfection de l'environnement proche du patient (table de chevet, adaptable, lit...), des surfaces fréquemment utilisées (poignées de porte, sanitaires...) ainsi que des locaux (sols, surfaces) selon des procédures et fréquences adaptées.




R32

Linge sale et déchets : évacuer au plus près du soin dans un sac fermé et selon la filière adaptée.




## II. Suite à une blessure par piqure accidentelle, classez les actions suivantes par ordre chronologique

- A) Vous alertez votre cadre de santé
- B) Vous demandez au patient/résident s'il est possible de lui faire un prélèvement pour une sérologie de contrôle
- C) Vous faites un lavage et une désinfection de la blessure
- D) Vous consultez un médecin, dans les 48 heures, afin d'obtenir un certificat initial d'accident de travail



## II. Suite à une blessure par pique accidentelle, classez les actions suivantes par ordre chronologique



## Prévention des accidents avec exposition au sang ou tout produit biologique d'origine humaine

Pour les soins utilisant un objet perforant :

- porter des gants de soins,
- utiliser les dispositifs médicaux de sécurité mis à disposition,
- après usage :
  - ne pas recapuchonner, ne pas plier ou casser, ne pas désadapter à la main,
  - si usage unique : jeter immédiatement après usage dans un conteneur pour objets perforants adapté, situé au plus près du soin, sans dépose intermédiaire, y compris lors de l'utilisation de matériel sécurisé,
  - si réutilisable : manipuler le matériel avec précaution et procéder rapidement à son nettoyage et sa désinfection.

R23

R24

Pour les soins exposant à un risque de projection/aérosolisation, porter des équipements de protection individuelle de manière adaptée (protection du visage, de la tenue, port de gants si peau lésée).

Mettre en œuvre des procédures et des techniques limitant les risques d'accident avec exposition au sang ou à tout produit biologique d'origine humaine dans les secteurs où sont pratiqués des actes/gestes à risque élevé (bloc opératoire, odontologie, laboratoire...).

R25

La conduite à tenir en cas d'accident avec exposition au sang doit être formalisée, actualisée et accessible à tous les intervenants dans les lieux de soins.

R26



Après pique, blessure : lavage et antiseptie au niveau de la plaie




Après projection sur muqueuse (conjonctive) : rinçage abondant



### **III. Dans quelles situations un masque chirurgical est nécessaire?**

- 1) Vous êtes enrhumé et venez rendre visite à votre tante, résidente en EHPAD
  
- 2) Au retrait d'un pansement souillé
  
- 3) Hospitalisé pour une légionellose, je porte le masque dans ma chambre lors de la visite de mes proches
  
- 4) Vous êtes IDE et vous allez réaliser une aspiration trachéale

## Dans quelles situations un masque chirurgical est nécessaire?




# Hygiène respiratoire



Faire porter un masque à toute personne (patient, résident, visiteur, professionnel de santé, intervenant extérieur, aidant...) présentant des symptômes respiratoires de type toux ou expectoration.

**R19**



Utiliser un mouchoir à usage unique pour couvrir le nez et la bouche lors de toux, éternuement et le jeter immédiatement après usage. En l'absence de mouchoir, tousser ou éternuer au niveau du coude ou en haut de la manche plutôt que dans les mains.

**R20**



Réaliser une hygiène des mains après contact avec des sécrétions respiratoires ou des objets contaminés. Ne pas toucher les muqueuses (yeux, nez, bouche) avec des mains contaminées.


**R21**



Mettre en place une information sur les mesures d'hygiène respiratoire à prendre et mettre à disposition le matériel nécessaire (masques, mouchoirs jetables...) dans les lieux stratégiques.

**R22**

**Éducation du patient à l'hygiène des mains**



TB germs spread through the air

## **Vous tousssez ?**

**Portez un masque**



**Désinfectez-vous les mains**



ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE HYGIÈNE HOSPITALIÈRE (juin 2015)



## Legionellose

- Infection respiratoire
- Inhalation de gouttelettes d'eau contaminées
- Sévérité chez les patients fragiles :  
Immunodéprimés +++
- Pas de transmission inter-humaine
- Pas de précautions particulières pour le patient