

**Des outils et supports de travail :
le Kit pour la mise en oeuvre des
précautions standard
et complémentaires, les supports
CPias**

Equipe d'hygiène CHSN/Colines

Kit pour la mise en œuvre des PS et PC

- 1^{ère} version en 2012
 - Aider les soignants dans les différentes mesures
 - Largement diffusé
- 2017/2018: évaluation
 - Simplification des supports
 - Orientation des messages vers les usagers/ visiteurs et patients
- Nécessité de mise à jour
 - Recommandations PC air/gouttelettes 2013
 - Précautions standard 2017

Version 2012



Tableau récapitulatif de l'emploi du KIT

Type de précautions	Précautions «Standard»	Précautions complémentaires «Contact»	Précautions complémentaires «Contact» à mesures spécifiques		Précautions complémentaires «Gouttelettes»	Précautions complémentaires «Air»
Les indications	<ul style="list-style-type: none"> Pour le patient et le soignant quel que soit son statut infectieux 	<ul style="list-style-type: none"> En cas de : <ul style="list-style-type: none"> Germes multi résistants (BMR) Diarrhées (hors Clostridium) Parasitoses cutanées, poux (hors gale) ... 	<ul style="list-style-type: none"> Diarrhée à Clostridium difficile 	<ul style="list-style-type: none"> La Gale 	<ul style="list-style-type: none"> En cas de : <ul style="list-style-type: none"> Coqueluche Grippe Infections respiratoires à BMR Rubéole Méningite bactérienne à méningocoque ... 	<ul style="list-style-type: none"> Tuberculose Varielle Rougeole ...
Mode de Transmission	<ul style="list-style-type: none"> Par le sang Les liquides biologiques pouvant contenir du sang Les muqueuses La peau lésée 	<ul style="list-style-type: none"> Par contact direct ou indirect 	<ul style="list-style-type: none"> Par contact direct ou indirect 	<ul style="list-style-type: none"> Par contact direct ou indirect 	<ul style="list-style-type: none"> Par des projections de gouttelettes (> 5 microns) de salive ou de sécrétions des voies aériennes supérieures (toux, éternuement) 	<ul style="list-style-type: none"> Par des particules très fines < 5 microns pouvant rester en suspension dans l'air
Outils disponibles	<ul style="list-style-type: none"> Poster 	<ul style="list-style-type: none"> Fiche réflexe précautions complémentaires «Contact» Affichette mains 	<ul style="list-style-type: none"> Fiche réflexe mesures spécifiques : I.C.D Affichette mains 	<ul style="list-style-type: none"> Fiche réflexe mesures spécifiques : G Affichette mains 	<ul style="list-style-type: none"> Fiche réflexe précautions complémentaires «Gouttelettes» Affichette masque chirurgical 	<ul style="list-style-type: none"> Fiche réflexe précautions complémentaires «Air» Affichette appareil de protection respiratoire de type FFP



< Poster A3

ou son statut sérologique en cas de contact avec : **DU SANG, UN AUTRE LIQUIDE BIOLOGIQUE, UNE MUQUEUSE, UNE PEAU LÉSÉE ...**

VISITEURS
Lorsque vous allez frapper en jouant...

TRANSPORT
Précautions biologiques, Matériel usagé, Linge usagé. Ils doivent être dans un emballage étanche et fermé.

MATÉRIEL et SURFACES
Je vérifie que le matériel à utiliser (préparation ou désinfection) ouvre, Je manipule avec précautions le matériel avant et après utilisation, Je nettoie et désinfecte le plus rapidement possible par des liquides biologiques.

DÉCHETS
Ordures ménagères, Déchets de soins à éliminer au plus près du soin. Élimination pluriquotidienne.

PORT DE GANTS
1 paire = 1 geste. Je mets des gants.

HYGIÈNE DES MAINS
Friction alcoolique systématique.

PRÉCAUTIONS COMPLÉMENTAIRES «CONTACT»
Prévenir la transmission par les mains et l'environnement

ENTRETIEN DES SOUS ET DES SURFACES
Procédure habituelle d'entretien avec un détergent/désinfectant.

< Fiche A4

Précautions « Contact »

Merci de prendre contact avec l'infirmière avant d'entrer

< Fiche A5



PRÉCAUTIONS COMPLÉMENTAIRES «CONTACT»

Prévenir la transmission par les mains et l'environnement



Précautions « Contact »



Merci de prendre contact
avec l'infirmière avant d'entrer




PRÉCAUTIONS COMPLÉMENTAIRES «GOUTTELETTES»

Prévenir la transmission par les projections : toux, éternuement ...



Précautions « Gouttelettes »



masque chirurgical

Merci de prendre contact avec l'infirmière avant d'entrer

Conception - Impression Imprimerie Nazairienne - 02 40 22 43 92

Réseau d'hygiène COLINES 09/2012

Evolution du kit

- Changement de graphisme
 - Maintien du code couleur initial
- Orientation des messages ciblés vers les professionnels, patients et visiteurs
- Simplification des fiches réflexes destinées aux soignants aux seuls mesures des précautions complémentaires
- 1 kit pour les ES et 1 kit pour les EMS

Présentation du kit

TABLEAU RÉCAPITULATIF DE L'EMPLOI DU KIT

Précautions	«Standard»	complémentaires «Contact»	complémentaires «Contact» spécifiques LCD	complémentaires «Contact» spécifiques G	complémentaires «Aérosols»	complémentaires «Air»
Indications	Pour le patient et le soignant quel que soit son statut infectieux	En cas de : <ul style="list-style-type: none"> • Curieux multi résistants (EMR) • Diarrhées (hors Clostridielles) • Parasitose cutanée, poux (hors gelé) ... 	Diarrhée à Clostridium difficile	La Dole	En cas de : <ul style="list-style-type: none"> • Coqueluche • Crises • Infections respiratoires à EMR • Tuberculose • Méninngite bactérienne à méningocoque ... 	<ul style="list-style-type: none"> • Tuberculose • Varicelle • Rougeole ...
Mode de Transmission	<ul style="list-style-type: none"> • Par le sang • Les liquides biologiques pouvant contenir du sang • Les muqueuses • La peau lésée 	<ul style="list-style-type: none"> • Par contact direct ou indirect 	<ul style="list-style-type: none"> • Par contact direct ou indirect 	<ul style="list-style-type: none"> • Par contact direct ou indirect 	<ul style="list-style-type: none"> • Par des projections de gouttelettes (\rightarrow 5 microns) de salive ou de sécrétions des voies aériennes supérieures (toux, éternuement) 	<ul style="list-style-type: none"> • Par des particules très fines ($<$ 5 microns) pouvant rester en suspension dans l'air
Outils disponibles	<ul style="list-style-type: none"> • Poster 	<ul style="list-style-type: none"> • Fiche réflexe précautions complémentaires «Contact» • Affichette signalisation 	<ul style="list-style-type: none"> • Fiche réflexe LCD • Affichette signalisation 	<ul style="list-style-type: none"> • Fiche réflexe G • Affichette signalisation 	<ul style="list-style-type: none"> • Fiche réflexe précautions complémentaires «Gouttelettes» • Affichette signalisation 	<ul style="list-style-type: none"> • Fiche réflexe précautions complémentaires «Air» • Affichette signalisation

CC-BY-SA/ARL/ septembre 2016



ARLIN Pays de la Loire - CHU Le Tourville
5 rue professeur Yves Boquien - 44033 Nantes
Tel : 02 40 08 30 95 - Fax : 02 40 08 47 72



COUNES
C.H. de Saint-Nazaire - D.P.414
44005 - Saint-Nazaire Cedex
Tel. 02 72 27 95 35

KIT pour la mise en œuvre des précautions «Standard» et «Complémentaires»



PRÉCAUTIONS STANDARD 2019 : QUI ? QUOI ? COMMENT ?

Poster

Gestion de l'environnement

- Matériel ou dispositif médical réutilisable**
 - Après utilisation, nettoyer et désinfecter le matériel avec une procédure appropriée
- Environnement du patient**
 - Nettoyer et désinfecter l'environnement proche (table, chevet, etc.), les surfaces fréquemment utilisées (poignées de porte, sanitaires, etc.)
- Linge sale et déchets**
 - Evacuer au plus près du soin dans un sac fermé et selon la filière adaptée

Gestion des excréta

- Porter des équipements de protection individuelle
- Eviter les procédures manuelles de vidange et d'entretien des urinaux, seaux et bassins, etc. et proscrire leur rinçage avec douche et douchette



Hygiène des mains

- Friction hydro-alcoolique
- Avant et après chaque soin
- Après avoir touché l'environnement
- Avant un geste aseptique

Précautions complémentaires "AIR"
Prévenir la transmission aéroportée

- Si vous tousez éternuez, utilisez un mouchoir à usage unique en l'absence, tout au niveau du cou
- Si vous êtes enrhumé, vous toussiez, portez un masque

Précautions complémentaires "GOUTTELETTES"
Prévenir la transmission par les projections : toux, éternuement ...

Précautions "CONTACT" SPÉCIFIQUES ICD
Prévenir la transmission par les mains et l'environnement

Précautions "CONTACT" SPÉCIFIQUES G
Prévenir la transmission par les mains et l'environnement

Précautions complémentaires "CONTACT"
Prévenir la transmission par les mains et l'environnement

Appliquer les précautions standard

Merci de prendre contact avec un membre de l'équipe
Précautions « AIR »

Merci de prendre contact avec un membre de l'équipe
Précautions « GOUTTELETTES »

Merci de prendre contact avec un membre de l'équipe
Précautions « CONTACT » SPÉCIFIQUES ICD

Merci de prendre contact avec un membre de l'équipe
Précautions « CONTACT » SPÉCIFIQUES G

Merci de prendre contact avec un membre de l'équipe
Précautions « CONTACT »



Sols et surfaces

- Entretien quotidien avec les produits habituels

Gestion des excréta

- Privilégier lave bassin ou sac protecteur à usage unique
- Élimination des protections d'incontinence et des sacs protecteurs :
 - dans les DASRI en cas de diarrhée infectieuse
 - dans les DAS pour les BMR et BHR

Matériel de soins

- Individualisé si possible (brassard à TA, etc.)
- Essuyage humide avec un détergent/désinfectant après chaque utilisation
- Pas de stock de consommables dans la chambre
- Ne pas jeter le matériel non utilisé

Affichettes de signalisation

Mode d'emploi

TABLEAU RÉCAPITULATIF DE L'EMPLOI DU KIT

Précautions	«Standard»	complémentaires «Contacts»	complémentaires «Contacts» spécifiques L.C.D	complémentaires «Contacts» spécifiques G	complémentaires «Gouttelettes»	complémentaires «Air»
Indications	<p>Pour le patient et le soignant quel que soit son statut infectieux</p>	<p>En cas de :</p> <ul style="list-style-type: none"> ⊗ Cerveux multi résistants (EMR) ⊗ Diarrhées (hors Clostridium) ⊗ Parasitose cutanée, poux (hors gale) ... 	<p>Diarrhée à Clostridium difficile</p>	<p>La Gale</p>	<p>En cas de :</p> <ul style="list-style-type: none"> ⊗ Coqueluche ⊗ Grippe ⊗ Infections respiratoires à EMR ⊗ Rubéole ⊗ Méningite bactérienne à méningocoque ... 	<ul style="list-style-type: none"> ⊗ Tuberculose ⊗ Varicelle ⊗ Rougeole ...
Mode de Transmission	<ul style="list-style-type: none"> ⊗ Par le sang ⊗ Les liquides biologiques pouvant contenir du sang ⊗ Les muqueuses ⊗ La peau lésée 	<ul style="list-style-type: none"> ⊗ Par contact direct ou indirect 	<ul style="list-style-type: none"> ⊗ Par contact direct ou indirect 	<ul style="list-style-type: none"> ⊗ Par contact direct ou indirect 	<p>Par des projections de gouttelettes (→ 5 microns) de salive ou de sécrétions des voies aériennes supérieures (toux, éternuement)</p>	<p>Par des particules très fines ← 5 microns pouvant rester en suspension dans l'air</p>
Outils disponibles	<ul style="list-style-type: none"> ⊗ Poster  	<ul style="list-style-type: none"> ⊗ Fiche réflexe précautions complémentaires «Contacts»  ⊗ Affichette signalisation  	<ul style="list-style-type: none"> ⊗ Fiche réflexe L.C.D.  ⊗ Affichette signalisation  	<ul style="list-style-type: none"> ⊗ Fiche réflexe G  ⊗ Affichette signalisation  	<ul style="list-style-type: none"> ⊗ Fiche réflexe précautions complémentaires «Gouttelettes»  ⊗ Affichette signalisation  	<ul style="list-style-type: none"> ⊗ Fiche réflexe précautions complémentaires «Air»  ⊗ Affichette signalisation 

MISE EN ŒUVRE DES PRÉCAUTIONS «STANDARD» ET «COMPLÉMENTAIRES»

POUR QUI ?



Pour les équipes soignantes, les professionnels, les visiteurs, les patients ou résidents des établissements de santé et médico sociaux.

POURQUOI ?

- ⊗ Aider à la mise en place et à l'application des mesures recommandées pour prévenir la transmission croisée
- ⊗ Contribuer à la protection des professionnels
- ⊗ Utiliser des supports d'information au plus près des soins

COMMENT ?

Les précautions «Standard» (circulaire n° 98-249 du 20 avril 1998) :

- ⊗ Constituent la base de l'hygiène
- ⊗ Préviennent le risque infectieux de patient ou résident à soignant, de soignant à patient ou résident et de patient ou résident à patient ou résident
- ⊗ S'appliquent par tous les soignants, pour toute personne qu'elle soit infectée ou non, quels que soient sa pathologie, son âge ou son statut sérologique, en cas de contact avec du sang, un autre liquide biologique, une muqueuse, une peau lésée

A ces précautions «Standard» peuvent s'associer dans certains cas des précautions «Complémentaires» :

- ⊗ Elles viennent en complément des précautions «standard»
- ⊗ Elles s'appliquent suivant le mode de transmission des micro-organismes

Il existe trois types de précautions complémentaires :

- ⊗ Contact avec deux cas particuliers :
 - ⊗ la Gale
 - ⊗ L'infection à Clostridium Difficile
- ⊗ Gouttelettes
- ⊗ Air

COMPOSITION DU KIT :

- ⊗ 1 poster sur les précautions «Standard»
- ⊗ 5 fiches A4 réflexes :
 - ⊗ Précautions complémentaires «Contact»
 - ⊗ Précautions «Contact» spécifiques : I.C.D
 - ⊗ Précautions «Contact» spécifiques : G
 - ⊗ Précautions complémentaires «Gouttelettes»
 - ⊗ Précautions complémentaires «Air»
- ⊗ 5 affichettes A5 de signalisation :

MODE D'EMPLOI DU KIT :

- ⊗ Le poster détaille les précautions «Standard» : l'hygiène des mains, le port des gants, la protection de la tenue, le port du masque et des lunettes, l'entretien des matériels de soins et des surfaces, la gestion du linge et des déchets, la conduite à tenir en cas d'AES.

Il peut être affiché dans les salles de soins.

- ⊗ Les fiches réflexes expliquent les précautions complémentaires. Un code couleur permet de repérer visuellement le type de précautions complémentaires : «Contact» «Gouttelettes» «Air»

Une autre couleur a été retenue pour différencier les cas particuliers :

la Gale (G) et les Infections à Clostridium Difficile (I.C.D)

Le choix des initiales vise à garantir la confidentialité.


Les fiches A4 réflexes peuvent s'afficher sur l'unité mobile de protection (ou dispositif équivalent) pour les services de soins des établissements de santé ou à l'entrée de la chambre pour les autres structures.

Elles sont associées à une affichette A5 de signalisation à mettre sur la porte de la chambre.

Les affichettes représentent à la fois le mode de transmission et la mesure de prévention à mettre en œuvre : les mains, le masque chirurgical, appareil de protection respiratoire de type FFP (FFP1 ou FFP2).

Le tableau au verso récapitule les mesures et leurs indications.

PRÉCAUTIONS STANDARD 2019 : QUI ? QUOI ? COMMENT ?



Gestion de l'environnement



Matériel ou dispositif médical réutilisable

- Après utilisation, nettoyer et désinfecter le matériel avec une procédure appropriée



Environnement du patient

- Nettoyer et désinfecter l'environnement proche (table, chevet, etc.), les surfaces fréquemment utilisées (poignées de porte, sanitaires, etc.)



Linge sale et déchets

- Evacuer au plus près du soin dans un sac fermé et selon la filière adaptée

Gestion des excreta



- Porter des équipements de protection individuelle
- Éviter les procédures manuelles de vidange et d'entretien des urinaux, seaux et bassins, etc. et proscrire leur rinçage avec douche et douchette



PROFESSIONNELS



PATIENT



- Si vous toussiez ou éternuez, utilisez un mouchoir à usage unique, en l'absence, toussiez au niveau du coude



- Si vous êtes enrhumé et/ou si vous toussiez, portez un masque



Friction hydro-alcoolique

- En entrant et en sortant de la chambre
- Avant et après l'accès à une pièce commune



Lavage à l'eau et au savon

- Si mains visiblement souillées



VISITEURS

Hygiène des mains

Friction hydro-alcoolique

- Avant et après chaque soin
- Après avoir touché l'environnement
- Avant un geste aseptique

Equipements de protection individuelle

Gants

- Uniquement en cas de risque d'exposition à un liquide biologique, de contact avec une muqueuse et la peau lésée
- Les mettre juste avant le geste et les retirer juste après

Protection du visage

- Lunettes et masque en cas de risque d'exposition par projection ou aérosolisation de produit biologique d'origine humaine

Tablier imperméable à usage unique

- Pour tout soin souillant ou mouillant ou à risque de projections de produit biologique

Gestion des Accidents avec Exposition au Sang

- Porter les protections individuelles pour les soins exposant à un risque de projections / aérosolisation
- Pour les soins utilisant un objet perforant : porter des gants et utiliser les dispositifs médicaux sécurisés
- Connaître la conduite à tenir en cas d'AES



CPias
Région de la Loire

Fiche réflexe

Précautions complémentaires "CONTACT"

Prévenir la transmission par les mains et l'environnement

Appliquer les précautions standard

Sols et surfaces

- Entretien **quotidien** avec les produits habituels



Gestion des excréta

- Privilégier lave bassin ou sac protecteur à usage unique
- Elimination des protections d'incontinence et des sacs protecteurs :
 - dans les **DASRI** en cas de diarrhée infectieuse
 - dans les **DAS** pour les BMR et BHR



Matériel de soins

- Individualisé si possible (brassard à TA, etc.)
- Essuyage humide avec un détergent/désinfectant après chaque utilisation
- Pas de stock de consommables dans la chambre
- Ne pas jeter le matériel non utilisé



Hygiène des mains

- Friction hydro-alcoolique **systématiquement** avant et après tout contact avec le résident et son environnement



Protection de la tenue

- Si **contact rapproché** avec le résident et son environnement
- A éliminer immédiatement après le soin (DAS)



Fiche de signalisation sur la porte



Merci de prendre contact avec un membre de l'équipe
Précautions « **CONTACT** »



Dès l'entrée



UNIQUEMENT
si contact rapproché



Avant de sortir



Avant de sortir de la chambre



Dès l'entrée



A la sortie



Précautions "CONTACT" SPÉCIFIQUES : G

Prévenir la transmission par les mains et l'environnement

Sols et surface

Nettoyer et /ou désinfecter l'environnement proche du patient (table, chevet, ...) des surfaces fréquemment utilisées (poignées de porte, sanitaires ...)

Linge

- se référer à la procédure spécifique de l'établissement "linge contaminé" identifier sac : "gale + date conditionné"
- linge à 60°
- linge fragile :
 - mettre dans un sac plastique
 - pluvérisation avec produit acaricide A-Par
 - ou isolement sac fermé pendant 3 jours puis lavage habituel

Matériel de soins

- individualisé si possible (brassard à TA ...)
- essuyage humide avec un détergent/désinfectant après chaque utilisation
- Pas de stock *de consommable* dans la chambre,

Application des précautions standard

Chambre seule **OBLIGATOIRE**

Maintien des précautions jusqu'à 48 h après traitement



- Friction hydro alcoolique dès l'entrée dans la chambre

Avant de sortir de la chambre

- lavage à l'eau et au savon puis friction hydro-alcoolique

Équipement de protection

Si contact cutané, linge et literie

surblouse manches longues à usage unique



- gants : 1 soin = 1 paire de gants. Recouvrir les mains de la surblouse

à éliminer avant de sortir de la chambre (DASRI)

AVANT D'ENTRER PRENEZ CONTACT AVEC UN MEMBRE DE L'ÉQUIPE

Précautions « CONTACT » SPÉCIFIQUES : G

PROFESSIONNELS

Dès l'entrée



Pour tous les soins



Avant de sortir



PATIENT

Limitation des déplacements

Limitation des visites

VISITEURS

Dès l'entrée



Avant de sortir de la chambre



115%



Précautions "CONTACT" SPÉCIFIQUES : I.C.D.

Prévenir la transmission par les mains et l'environnement

Application des précautions standard

Chambre seule **OBLIGATOIRE**

Maintien des précautions jusqu'à 48 h
après la disparition des signes cliniques

Sols et surface

- entretien quotidien et dès que souillé avec un détergent désinfectant sporicide OU nettoyage avec un détergent neutre, rinçage à l'eau + désinfection à l'eau de Javel 0,5% : 200 ml d'eau de javel à 2,6% pour 800 ml d'eau = 1 l à 0,5% (stable 24 h)

Gestion des excréta

- lave bassin ou sac protecteur à usage unique
- Protection d'incontinence dans les DASRI

Matériel de soins

- individualisé si possible (brassard à TA ...)
- essuyage humide avec un détergent/désinfectant sporicide après chaque utilisation
- Pas de stock de consommable dans la chambre



Friction hydro alcoolique dès l'entrée dans la chambre

- Avant de sortir de la chambre lavage à l'eau et au savon, puis friction hydro alcoolique

Equipement de protection

Si contact cutané, linge et literie

surblouse manches longues à usage unique

- gants : 1 soin = 1 paire de gants
Recouvrir les mains de la surblouse

Après le soin, friction hydro alcoolique avant de sortir de la chambre

AVANT D'ENTRER PRENEZ CONTACT AVEC UN MEMBRE DE L'ÉQUIPE

Précautions « CONTACT » SPÉCIFIQUES : I.C.

PROFESSIONNELS

Avant l'entrée



Si contact avec le patient et/ou son environnement



Avant de sortir



Limitation des déplacements

Avant de sortir de la chambre



PATIENT



VISITEURS

Dès l'entrée



Avant de sortir de la chambre



Précautions complémentaires "GOUTTELETTE"

Prévenir la transmission par les projections : toux, éternement .

Application des précautions standard

Sols et surfaces

- entretien quotidien avec les produits habituels

Matériel de soins

- individualisé si possible (brassard à TA ...)
- essuyage humide avec un détergent/désinfectant après chaque utilisation
- Pas de stock de consommable dans la chambre,
- Ne pas jeter le matériel non utilisé

Protection de la tenue

- si contact rapproché avec le patient et son environnement
- à éliminer immédiatement après le soin (DAS)

PROFESSIONNELS



Friction hydro alcoolique systématiquement avant et après tout contact avec le patient et son environnement



Masque chirurgical

- Dès l'entrée dans la chambre (élimination DAS)



Masque FFP2

- Dès l'entrée dans la chambre
- pour toute manœuvre respiratoire, invasive (intubation, extubation, fibroscopie, kiné, respiratoire, prélèvement nasal)



Lunettes de protection

- en cas de risque de projections

AVANT D'ENTRER PRENEZ CONTACT AVEC UN MEMBRE DE L'ÉQUIPE

Précautions « GOUTTELETTES »



Dès l'entrée



A la sortie retirer le masque



Avant de sortir de la chambre



Dès l'entrée



A la sortie retirer la masque



115%



Précautions complémentaires "AIR"

Prévenir la transmission aéroportée

Application des précautions standard
Chambre seule **OBLIGATOIRE**
MAINTENIR LA PORTE FERMÉE



Sols et surfaces

- entretien quotidien avec les produits habituels
- aération pluriquotidienne

Matériel de soins

- individualisé si possible (brassard à TA ...)
- essuyage humide avec un détergent/désinfectant après chaque utilisation
- Pas de stock de consommable dans la chambre,
- Ne pas jeter le matériel non utilisé

Friction hydro alcoolique

- avant et après tout contact avec le patient et son environnement

Masque FFP2

- A mettre avant d'entrer dans la chambre
- Enlever après être sorti et avoir refermé la porte
- Eliminer dans les DAS

Protection de la tenue

- si contact rapproché avec le patient et son environnement
- à éliminer immédiatement après le soin (DAS)



80,7%



AVANT D'ENTRER PRENEZ CONTACT AVEC UN MEMBRE DE L'ÉQUIPE

Précautions « AIR »

PROFESSIONNELS



Avant d'entrer



A la sortie retirer le masque



PATIENT



Avant de sortir de la chambre



VISITEURS



Avant d'entrer



Après être sorti retirer le masque



Rappel des supports Cpias pour la gestion des épidémies

- Check list
- Affiches visiteurs
- Mise en place des PC
- Suivi des patients/résidents malades

Visiteurs

En raison d'une **épidémie de gastro-entérite**, nous vous recommandons de vous frictionner les mains avec une **Solution Hydro-Alcoolique** (friction des mains jusqu'au séchage) avant et après votre visite.

Merci.



Nom de l'établissement :

Année :

Infections respiratoires aiguës

Nombre de nouveaux cas																																							
8																																							
7																																							
6																																							
5																																							
4																																							
3																																							
2																																							
1																																							
		24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		septembre							octobre																														

Cas groupés d'infections respiratoires aiguës basses (IRA) : 3 IRA dans un délai de 8 jours, en dehors des pneumopathies de déglutition, chez des personnes partageant les mêmes lieux, qu'elles soient résidentes de l'établissement ou membres du personnel.

Gastro-entérites aiguës

Nombre de nouveaux cas																																							
8																																							
7																																							
6																																							
5																																							
4																																							
3																																							
2																																							
1																																							
		24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		septembre							octobre																														

Cas groupés de gastro-entérites aiguës (GEA) : 5 GEA dans un délai de 4 jours. Chez des personnes partageant les mêmes lieux, qu'elles soient résidentes de l'établissement ou membres du personnel.

Conclusion

- Aide à la mise en place précoce des mesures d'hygiène
- Uniformisation des pratiques sur les établissements
- Information des usagers et des patients