

Durée des mesures de prévention pour les résidents infectés à COVID-19 hébergés en EMS

Résidents COVID-19 asymptomatique

J 0 = Date de PCR ou test antigénique +

Tout résident asymptomatique

Application des
Précautions « COVID »
quel que soit le service

J 5

TAG ou PCR-

J 7

De la date de PCR ou
TAG+

Précaution
« STANDARD »

Résidents COVID-19 symptomatique

J 0 = Début des symptômes

Résident
non immunodéprimé

J 5

TAG ou PCR-

J 7

Du début des
symptômes

Précaution
« STANDARD »

Cas hospitalisé en Réanimation **ou**
immunodéprimé **ou** sujet âgé traité sous
O₂ (>6L/min)

Application des
Précautions « COVID » quel que
soit le service

Si absence de signes
cliniques depuis 48h
(fièvre, dyspnée)

J 20

Du début des
symptômes

Précaution
« STANDARD »

Résidents Contacts à risque

J 0 = Date de dernière exposition

Résident
contact à risque de COVID-19

Application des
Précautions « COVID » quel que
soit le service

J 5-7

Réalisation d'un
prélèvement naso-
pharyngé et RT-PCR ou
TAG

De la date
d'exposition

Résultat POSITIF
Maintien des mesures

Résultat NEGATIF
Précaution
« STANDARD »

Absence de signes cliniques : disparition de la fièvre avec une température < 37,8°C (en l'absence de toute prise d'antipyrétique depuis au moins 12 heures) ET nette amélioration de l'état respiratoire définie par un besoin en oxygène ≤ 2 L/mn pour maintenir une SaO₂ au repos ≥ 95 %. La disparition de la toux ne constitue pas un bon critère dans la mesure où une toux irritative et de légers signes respiratoire peuvent persister au-delà la guérison.

Immunodépression : chimiothérapie pour cancer, cancer actif, VIH non traité avec CD4 < 200, déficit immunitaire combiné, corticothérapie (prednisone >20mg/jour) pendant plus de 14 jours, transplantés d'organes, hémopathies.