

Equipements de Protection Individuelle recommandés pour la prise en charge de patient suspect/confirmé COVID-19

Etablissements	Contexte d'entrée en chambre	Tablier plastique jetable	Surblouse à usage unique	Masque chirurgical	Masque FFP2	Lunettes/visière de protection	Gants à usage unique	Exemples
Etablissements de santé (Médecine, Chirurgie, Obstétrique, SSR)	Sans contact avec le patient <i>Précautions standard et gouttelettes</i>	✗	✗	✓	✗	✗	✗	Distribution des repas, Distribution des médicaments... Consultation sans contact physique... Brancardage sans manutention
	Avec contact mais SANS risque d'exposition aux liquides biologiques <i>Précautions standard, contact et gouttelettes</i>	✓	✗	✓	✗	✓ <i>Si signes resp. importants</i>	✗	Lever, mise au fauteuil, Retournement, Prise des constantes... Brancardage avec manutention
	Avec contact ET risque d'exposition aux liquides biologiques <i>Précautions standard, contact et gouttelettes</i>	✓	✗ *	✓	✗	✓ <i>Si signes resp. importants ou risque projection</i>	✓	Toilette, change, Prise de sang, pansements plaie et dispositifs invasifs
	Procédures à risque d'aérosolisation, quelque soit le statut du patient *** <i>Précautions standard, contact + aérosolisation</i>	✗ **	✓	✗	✓	✓	✓	Secteur de réanimation, Soins intensifs dédié COVID

* Une surblouse à manche longue jetable sera portée dans le cadre d'une exposition massive aux liquides biologiques (ex: diarrhée, vomissements, hémoptysie...)

** Tablier plastique si surblouse non imperméable

*** Procédures à risque d'aérosolisation: Prélèvement naso-pharyngé, Kinésithérapie respiratoire générant des aérosols (ex. kinésithérapie respiratoire pour désencombrement et expectoration induite), Intubation / extubation (dont masque laryngé), Ventilation mécanique avec circuit expiratoire « ouvert », Ventilation mécanique non invasive (VNI), Aspiration endotrachéale (hors système clos), Fibroscopie bronchique, Aérosolthérapie, Explorations fonctionnelles respiratoires, Autopsie, endoscopie digestive par voie haute, chirurgie ORL, maxilo-faciale, oxygénothérapie à débit élevé (> 6L/min.), actes de chirurgie dentaire avec usage d'instruments rotatifs à haute vitesse.

L'utilisation des équipements de protection individuelle doit être impérativement associée à une **observance stricte de l'hygiène des mains.**

