# Précautions complémentaires "CONTACT"

Prévenir la transmission par les mains et l'environnement

### Appliquer les précautions standard

### Sols et surfaces

 Entretien quotidien avec les produits habituels

### **Gestion des excreta**

- Privilégier lave bassin ou sac protecteur à usage unique
- Elimination des protections d'incontinence et des sacs protecteurs :
- → dans les DASRI en cas de diarrhée infectieuse
- $\rightarrow$  dans les **DAS** pour les BMR et BHR

### Matériel de soins

- Individualisé si possible (brassard à TA, etc.)
- Essuyage humide avec un détergent/désinfectant après chaque utilisation
- Pas de stock de consommables dans la chambre
- Ne pas jeter le matériel non utilisé





 Friction hydro-alcoolique systématiquement avant et après tout contact avec le patient et son environnement

### Protection de la tenue

- Si contact rapproché avec le patient et son environnement
- A éliminer immédiatement après le soin (DAS)



# Précautions "CONTACT" SPÉCIFIQUES G

### Prévenir la transmission par les mains et l'environnement

### Sols et surfaces

• Entretien quotidien de l'environnement du patient y compris chevet et placards avec les produits habituels

Linge

### Elimination:

- Se référer à la procédure spécifique de l'établissement, identifier le sac : "gale + date de conditionnement"
- Linge à 60°
- Linge fragile: mettre dans un sac plastique
  - → Pulvérisation avec un produit acaricide
  - → Ou isolement dans un sac fermé pendant 3 jours puis lavage habituel

### Matériel de soins

- Individualisé si possible (brassard à TA, etc.)
- Essuyage humide avec un détergent/désinfectant après chaque utilisation
- Pas de stock de consommables dans la chambre

Appliquer les précautions standard Chambre seule OBLIGATOIRE Maintien des précautions jusqu'à 48 h après traitement




- Friction hydro-alcoolique dès l'entrée dans la chambre
- Avant de sortir de la chambre, lavage à l'eau et au savon, puis friction hydroalcoolique



### Equipement de protection

Si contact cutané, linge et literie






• Gants : Recouvrir les manches de la surblouse 1 soin = 1 paire de gants

A éliminer avant de sortir de la chambre (DASRI)







# Précautions "CONTACT" SPÉCIFIQUES ICD

### Prévenir la transmission par les mains et l'environnement

Appliquer les précautions standard Chambre seule OBLIGATOIRE Maintien des précautions jusqu'à 48 h après la disparition des signes cliniques

### Sols et surfaces

• Entretien quotidien et dès que souillé avec un détergent désinfectant sporicide OU nettoyage avec un détergent neutre, rinçage à l'eau puis désinfection à l'eau de Javel 0,5% de chlore actif : 200 ml d'eau de javel à 2,6% et 800 ml d'eau = 1 l à 0,5% (stable 24 h)

### **Gestion des excreta**

- Lave bassin ou sac protecteur à usage unique
- Elimination des protections d'incontinence et des sacs protecteurs dans les DASRI

### Matériel de soins

- Individualisé si possible (brassard à TA, etc.)
- Essuyage humide avec un détergent/ désinfectant sporicide après chaque utilisation
- Pas de stock de consommables dans la chambre



### Hygiène des mains


Friction hydro-alcoolique dès l'entrée dans la chambre

 Avant de sortir de la chambre, lavage à l'eau et au savon, puis friction hydroalcoolique



### **Equipement de protection**

Si contact cutané, linge et literie






Gants:
 Recouvrir les manches
 de la surblouse
 1 soin = 1 paire de gants

A éliminer avant de sortir de la chambre (DASRI)







# Précautions complémentaires "GOUTTELETTES"

Prévenir la transmission par les projections : toux, éternuement ...

### Appliquer les précautions standard


FFP2

### Sols et surfaces

• Entretien quotidien avec les produits habituels

- (brassard à TA. etc.)
- Essuyage humide avec un détergent/désinfectant après chaque utilisation
- Pas de stock de consommables dans la chambre

### Matériel de soins



# Protection de la tenue

- Si contact rapproché avec le patient et son environnement
- A éliminer immédiatement après le soin (DAS)



Friction hydro-alcoolique systématiquement avant et après tout contact avec le patient et son environnement

### Masque chirurgical

• Dès l'entrée dans la chambre (élimination DAS)

### Masque FFP2

• Pour toute manœuvre respiratoire invasive (intubation, extubation, fibroscopie, kiné respiratoire, prélèvement nasal, etc.)

### Lunettes de protection

• En cas de risque de projections







# Précautions complémentaires "AIR"

### Prévenir la transmission aéroportée

Appliquer les précautions standard
Chambre seule OBLIGATOIRE
MAINTENIR LA PORTE FERMÉE

### Sols et surfaces

- Entretien quotidien avec les produits habituels
- Aération pluriquotidienne

### Matériel de soins

- Individualisé si possible (brassard à TA, etc.)
- Essuyage humide avec un détergent/ désinfectant après chaque utilisation
- Pas de stock de consommables dans la chambre



### Hygiène des mains

Friction hydro-alcoolique systématiquement avant et après tout contact avec le patient et son environnement

### Masque FFP2

- A mettre avant d'entrer dans la chambre
- A enlever après être sorti et avoir refermé la porte
- A éliminer dans les DAS

### Protection de la tenue

- Si contact rapproché avec le patient et son environnement
- A éliminer immédiatement après le soin (DAS)