Liste des dispositifs médicaux nécessaires à la vaccination COMIRNATY

Matériels nécessaires pour la reconstitution d'un flacon de vaccin Pfizer-BioNTech et l'administration de ses 5 doses :

- 1 dosette de 10 mL de chlorure de sodium 0,9%	→ Pour reconstitution
- 1 seringue de 2 mL (idéal pour la précision) ou 5 mL (à défaut)	→ Pour reconstitution
- 1 aiguille 21G verte	→ Pour reconstitution
- 5 aiguilles 25G orange	→ Pour prélèvement
- 5 seringues de type tuberculinique de 1mL	→ Pour prélèvement et injection IM
- 5 aiguilles ≥ 25mm (16mm si <60kg) 22G à 25G	→ Pour injection IM

Fourni avec les flacons de vaccin :

- 1 ampoule de 10 mL de chlorure de sodium 0,9%
- 1 seringue de 2 mL (idéal pour la précision) ou 5 mL (à défaut)
- 5 aiguilles 25 G
- 5 seringues de typer tuberculinique de 1 mL montées d'une aiguille de 25 G orange
- 1 aiguille 21G verte

ATTENTION : Il est recommandé de prévoir un stock du matériel nécessaire en cas de défaut de livraison

A prendre dans le service de soin :

- Flacon d'alcool à 70°
- Paquet de compresses stériles
- 1 collecteur pour objets perforants (collecteur d'aiguilles)

Trousse d'urgence en cas d'anaphylaxie :

- Deux ampoules de 1 mL d'adrénaline à 1mg/mL
- Deux seringues tuberculiniques de 1mL
- Deux aiguilles intramusculaires 21G
- Deux compresses pré imbibées d'antiseptique
- Une notice infographique (« CAT en cas d'anaphylaxie »)