Infections à *Clostridioides difficile*, quoi de neuf en prévention ?

Dr Clément Legeay

Unité de prévention et de lutte contre les infections nosocomiales

Journée des hygiénistes des Pays de la Loire - Mardi 28 juin 2022

-
- Prévention primaire : vaccination
 - Prévention de la transmission croisée : recommandations récentes
 - Réservoirs de C diff en milieu hospitalier

Infection à *Clostridioides difficile* (ICD)

PHYSIOPATHOLOGIE

Johnson S et al. *Clin Infect Dis* 1998
Pepin J et al. *CMAJ* 2004 ; INSPQ, 2005

Poutanen S., *CMAJ* 2004, 171, 51-58

Kyne, L. et al. *Lancet*, 2001 357 189-193
Kyne, L., *N EJM* 2000, 342, 390-397.

10% des diarrhées nosocomiales

Fréquente IAS

3% de mortalité

Incidence en augmentation, sous diagnostiqué

-
- **Prévention primaire : vaccination**
 - Prévention de la transmission croisée : recommandations récentes
 - Réservoirs de C diff en milieu hospitalier

Vaccination : quoi de neuf ?

- Un échec (Sanofi Pasteur) :
 - 6173 groupe vaccin vs 3085 groupe placebo
 - 27 pays, adultes > 50 ans « à risque »
 - Arrêt pour futilité en analyse intermédiaire
 - 0,29 infections pour 100 patients/année vs 0,28

	<i>C difficile</i> toxoid vaccine candidate group				Placebo group			Vaccine efficacy (95% CI)	
	Number of participants	Number of protocol-defined <i>C difficile</i> infections	Total person-years	<i>C difficile</i> infection rate per 100 person-years (95% CI)	Number of participants	Number of protocol-defined <i>C difficile</i> infections	Total person-years		
Modified intention-to-treat population	6173	34	11 697.2	0.29 (0.20-0.41)	3085	16	5789.4	0.28 (0.16-0.45)	-5.2% (-10.4 to 43.5)
Per-protocol population	4786	23	9847.7	0.23 (0.15-0.35)	2378	13	4888.9	0.27 (0.14-0.45)	12.2% (-8.8 to 57.3)

Data show the results of the first analysis for vaccine efficacy done at 50 clinical endpoints. *Clostridioides difficile* infections were confirmed by PCR.

Table 2: Efficacy of the *C difficile* toxoid vaccine candidate in the modified intent-to-treat and per-protocol analysis populations

- En attente publication
 - Pfizer : essai CLOVER, 17 500 adultes > 50 ans à risque
 - Communiqué début 2022 : « échec partiel sur l'objectif primaire (réduction des cas d'ICD), mais réduction importante de la gravité et durée des symptômes »
- Autres candidats vaccins à un stade moins avancé
 - Autres pistes que vaccins « toxiques »

Figure 2: Kaplan-Meier estimates of time to first protocol-defined case of *Clostridioides difficile* infection in the modified intention-to-treat population (A) and per-protocol analysis population (B). HR=hazard ratio.

-
- Prévention primaire : vaccination
 - Prévention de la transmission croisée : recommandations récentes
 - Réservoirs de C diff en milieu hospitalier

ELSEVIER

Contents lists available at ScienceDirect

Clinical Microbiology and Infection

journal homepage: www.clinicalmicrobiologyandinfection.com

Guidelines

Guidance document for prevention of *Clostridium difficile* infection in acute healthcare settings

S. Tschudin-Sutter^{1,*}, E.J. Kuijper², A. Durovic¹, M.J.G.T. Vehreschild³, F. Barbut⁴, C. Eckert⁴, F. Fitzpatrick⁵, M. Hell⁶, T. Norèn⁷, J. O'Driscoll⁸, J. Coia⁹, P. Gastmeier¹⁰, L. von Müller¹¹, M.H. Wilcox¹², A.F. Widmer¹ on behalf of the Committee†

■ 11 chapitres, 26 recos

■ Hygiène des mains (chap IV)

- Pas de recommandation en matière de technique/produit pour HDM
- PHA sont-ils associés à une augmentation incidence des ICD par rapport à eau+savon ?
 - En cas d'épidémie, il est recommandé de passer à l'eau et savon (reco conditionnelle, très faible niveau de preuve)
 - En cas d'endémie, il n'est pas recommandé de passer des PHA pour l'eau + savon (reco conditionnelle, très faible niveau de preuve)
- HDM est-elle associée à l'incidence des ICD ?
 - Mener des interventions pour augmenter l'HDM (reco conditionnelle, très faible niveau de preuve)

Guidelines

Guidance document for prevention of *Clostridium difficile* infection in acute healthcare settings

S. Tschudin-Sutter^{1,*}, E.J. Kuijper², A. Durovic¹, M.J.G.T. Vehreschild³, F. Barbut⁴, C. Eckert⁴, F. Fitzpatrick⁵, M. Hell⁶, T. Norèn⁷, J. O'Driscoll⁸, J. Coia⁹, P. Gastmeier¹⁰, L. von Müller¹¹, M.H. Wilcox¹², A.F. Widmer¹ on behalf of the Committee†

■ Situation épidémique

- Port des EPI (gants, surblouse, tablier) recommandé (reco forte, très faible niveau de preuve)
- Appliquer les précautions complémentaires contact* (reco forte, très faible niveau de preuve)

■ Situation endémique

- Port des EPI (gants, surblouse, tablier) recommandé (reco conditionnelle, très faible niveau de preuve)
- Appliquer les précautions complémentaires contact (reco conditionnelle, très faible niveau de preuve)

* Chambre individuelle, toilettes dédiées, matériel dédié, EPI, bionettoyage spécifique

HDM / EPI : toujours débattu

■ Epidémie ribotype 027 sur 4 structures d'un même groupe hospitalier en Suisse

→ 6 c

→ Aut
pro

→ Ges

Figure 1. Epidemiological curve of *C. difficile* 027 isolates and timeline of interventions.

Maitrise de l'environnement

- Environnement hospitalier contaminé par C diff
 - Chambre occupée précédemment par un ICD augmente le risque d'ICD
 - Matériel positif (toilettes, matériel de soin, matériel de bionettoyage...), air
 - Mains, EPI, tenue, chaussures des professionnels
 - Survie prolongée (plusieurs mois)
 - Dépendant de l'excrétion ? Rôle dans la transmission ?
 - « Dose infectante » probablement faible si facteurs de risque
- Qualité du bionettoyage
 - Facteurs matériels (qualité, disponibilité, efficacité)
 - Facteurs humains (disponibilité, formation, compétence...)

Shaughnessy et al Infect Control Hosp Epidemiol 2011
Sood G et al. Am J Infect Control 2022
Durovic et al. Clin Microbiol Infect 2018
Landelle et al. Infect Control Hosp Epidemiol 2014
Janezic et al. Clin Microbiol Infect 2021
Peters A et al. Antimicrob Resist Infect Control 2022

- Les bons produits
 - Sporicidie (NF EN 14347, NF T 72-230 / 72-231, NF EN 17126 depuis 2018)
 - Produit chloré : eau de Javel - Efficacité mais plusieurs défauts
 - Autres produits sporicide notamment détergent/désinfectant

- Les méthodes « no touch » (complémentaires !)
 - UV-C
 - H2O2
 - Avantages et défauts...

- Recos européennes 2018
 - Désinfection quotidienne chez les ICD et lors de leur sortie (sporicide)
 - « No touch » aussi efficaces que l'eau de Javel
 - « No touch » efficaces en cas d'épidémie ou d'endémie

(B) Hydrogen peroxide vs. Others

(C) UV vs. Others

(D) Hydrogen peroxide vs. Hypochlorite

Fig. 2. Forest plot presenting odds ratios for environmental *C. difficile* contamination in hospital rooms: (A) Hypochlorite vs. Others; (B) Hydrogen peroxide vs. Others; (C) UV vs. Others; (D) Hydrogen peroxide vs. Hypochlorite Cl, confidence interval; M-H, Mantel-Haenszel; UV, ultraviolet.

(B) Hydrogen peroxide vs. Others

(C) UV vs. Others

(D) UV vs. Hypochlorite

Fig. 3. Forest plot presenting odds ratios for incidence of hospital-acquired CDI: (A) Hypochlorite vs. Others; (B) Hydrogen peroxide vs. Others; (C) UV vs. Others; (D) UV vs. Hypochlorite CI, confidence interval; M-H, Mantel-Haenszel; UV, ultraviolet.

■ Amélioration du bionettoyage

- Matériel de qualité
- Formation des professionnels
- Sensibilisation au risque C diff
- Benchmark (marquage fluorescent, ATPmétrie...)
- Communication
- Présence de l'EOH

Figure 4. Forest plot of the effect of environmental cleaning bundles on the reduction of *Clostridioides difficile* infection rooms with positive cultures for *C. difficile*. CI, confidence interval.

-
- Prévention primaire : vaccination
 - Prévention de la transmission croisée : recommandations récentes
 - Réservoirs de C diff en milieu hospitalier

Contrôle C diff - Chaînon manquants ?

- De nombreux cas de C diff acquis à l'hôpital ne s'expliquent pas par la « transmission croisée »
- Porteurs asymptomatiques ?
- Autres réservoirs ?

Portage de C diff

- De 3% à près de 15% (voire plus si contexte épidémique) en milieu hospitalier
- PORTADIFF : 10 hôpitaux français, enquête de prévalence
 - Représentativité : chir, méd, réa, hématologie, gériatrie, SSR/SLD
 - Exclusion des suspects ICD, selles diarrhéiques
 - 721 patients inclus : 79 C diff (11%) et dont 53% toxigénique
 - Soit **5,8% de porteurs C diff asymptomatiques** dans les hôpitaux français (de 0% à 19%)
 - Relation entre l'incidence d'ICD et l'incidence du portage ?
 - Facteurs de risque portage : durée séjour, hospité récente, ATB, IPP, récente ICD
- Proximité génétique entre souches ICD et porteurs. Réservoir primaire ? Secondaire ? Contexte épidémique ?
 - Passage de porteur à ICD : 7% à 30%
- Inoculum chez les porteurs ? Contamination aussi importante que les ICD ?
- Pas de dépistage à ce stade (ECCMID 2018)

Ziakas et al. PLoS One 2015
Lemmonier et al. J Hosp Infect 2022
Gilboa et al Clin Microbiol Infect 2020
Halstead et al. J Hosp Infect 2019
Mettzer et al. Clin Microbiol Infect 2019

Une maladie communautaire ?

- Plus d'un quart des ICD diagnostiquées à l'hôpital ont une origine communautaire
 - CHU Angers 2016 - 2022 : 27% communautaires, 64% CHU, 9% autres structures de soins

- Etude sur échantillons de selles en communautaires
 - Patients consultant leur MT pour troubles digestifs ou diarrhées
 - 2541 patients screenés : 3,27% positifs en essai de cytotoxicité (1,81% en culture)

Table 1
Factors associated with positive cytotoxicity assay or positive toxigenic *Clostridium difficile* (multivariate analysis) in patients ≥ 3 years old

Variables	Toxigenic culture			CTA		
	OR	(95% CI)	p	OR	(95% CI)	p
Age (years)						
3–16	0.998	0.987–1.022	0.910	1.002	0.974–1.030	0.526
17–45	ref			ref		
46–64	0.992	0.974–1.010	0.401	0.988	0.952–1.025	0.459
≥ 65	1.00	0.977–1.022	0.993	0.989	0.964–1.015	0.425
Gender (male)	0.988	0.974–1.003	0.132	0.997	0.981–1.014	0.799
Abdominal pain	0.997	0.981–1.013	0.758			
Antimicrobials in the previous month	1.078	1.056–1.101	<0.001	1.058	1.034–1.082	<0.001
Hospitalization in the previous 12 weeks	1.042	1.008–1.078	0.015	1.049	1.014–1.085	0.005
Diarrhoeal stools ^a	1.017	1.002–1.032	0.025	1.004	0.986–1.022	0.635
Stools with blood or mucus	—	—	—	1.979	0.911–1.053	0.582

^a Defined as taking the shape of the container.

Prévention C diff en milieu de soins

Précautions "CONTACT" SPÉCIFIQUES
Prévenir la transmission par les mains et l'environnement

Sols et surfaces

- Nettoyer quotidiennement les surfaces de contact et les surfaces de passage avec des produits hospitaliers.

Hygiène des mains

- Appliquer les précautions standard
- Maintenir des précautions jusqu'à 48 h après traitement

Équipement de protection

- Gants
- Surbrassards
- Lunettes
- Masque
- Chaussures

Environnement contaminé

Patient ICD

ATB stewardship
Préservation microbiote ?
Vaccin ?

Hôte susceptible

Diagnostic PCC spécifique
EPI, HDM
Entretien quotidien

Hygiène locaux
Entretien matériel soins
HDM

Précautions standard

Porteur asymptomatique

Portage communautaire ou hospitalier

FdR ? ATB, hospit réente ICD récente, IPP ?
Mais aussi animaux, enfants, alimentation ?
Excrétion ?

Merci de votre attention

US CDC – Prevent the spread of C diff. Information to patients