

VRAI/FAUX



**1/ La friction Hydro Alcoolique (FHA)
doit être privilégiée même en
présence de souillures sur les mains.**

VRAI/FAUX



Faux

En présence de mains visuellement souillées, la FHA n'est pas recommandée car elle ne sera pas efficace.

Il est recommandé dans ce cas d'effectuer une hygiène des mains par lavage simple (eau et savon) puis une fois les mains nettoyées (propres) et complètement sèches de réaliser une FHA pour désinfecter les mains.

VRAI/FAUX



2/ Le port d'une alliance diminue l'efficacité de la friction hydro-alcoolique (FHA)?

VRAI/FAUX



Vrai

Le port de bijoux sur les mains et poignets diminuent l'efficacité de la FHA même si c'est une alliance lisse .

Les bijoux ne seront pas désinfectés ainsi que les endroits de la peau où ils sont situés.

En préalable à l'hygiène des mains, on doit

- porter une tenue à manches courtes/avant bras dégagés
- avoir des ongles courts, sans vernis ni faux ongles
- ne porter aucun bijou (y compris montre et bague)

VRAI/FAUX



3/ Les Produits Hydro Alcoolique (PHA) sont efficaces sur les Bactéries multi Résistantes (BMR) et les Bactéries Hautement Résistantes émergentes (BHRe)

VRAI/FAUX



Vrai

Les BMR et BHRe sont résistantes aux antibiotiques mais pas au PHA qui reste efficace sur ces bactéries grâce à leur concentration d'alcool (environ 80%).

Le PHA doit répondre aux normes

EN 1040 - bactericidie

EN 14476 - virucidie

VRAI/FAUX



5/ L'utilisation de flacon de poche de Solution Hydro Alcoolique est indiquée lors des soins.

VRAI/FAUX



Vrai

Un flacon de poche de SHA peut être indiqué dans certains secteurs de soins. Quelque soit le mode de distribution, le PHA doit être mis à disposition au plus près du soin.

Il est important de ne pas manipuler le flacon de nouveau après s'être désinfecté les mains : sortir le flacon de sa poche, mettre un volume adapté de PHA dans le creux de la main, ranger le flacon dans sa poche, frictionner en respectant la gestuelle.

VRAI/FAUX



6/ Le PHA peut être utilisé sur les surfaces si je n'ai pas de produit désinfectant à portée de main.

VRAI/FAUX



Faux

Le PHA n'a pas d'action sur les surfaces inertes : le mobilier, les bijoux, crayon, les gants mais aussi le vernis et les faux ongles en gel ou en résine.

VRAI/FAUX



7/ Je dois porter des gants :

- Dès l'entrée dans la chambre d'un résident porteur d'une BMR ou d'une BHRé
- Si j'ai des lésions cutanées ou coupures sur les mains
- En présence d'un résident atteint par la gale
- En présence d'un résident porteur de *Clostridium Difficile* (*Clostridioides Difficile*)

VRAI/FAUX



Vrai

Je dois porter des gants si :

J'ai des lésions cutanées ou coupures sur les mains

En présence d'un résident atteint par la gale

En présence d'un résident porteur de *Clostridioides Difficile*

Faux

Je n'ai pas besoin de porter des gants :

Dès que j'entre dans la chambre d'un résident porteur d'une BHRé ou d'une BMR, je les porte au moment du soin après une Friction Hydro Alcoolique.

VRAI/FAUX



8/ Après la toilette intime, je peux continuer la toilette du résident avec la même paire de gants.

VRAI/FAUX



Faux

1 paire de gants = 1 geste

Après la toilette intime, les gants sont contaminés donc à retirer en respectant la technique de retrait

Pratiquer une Friction Hydro Alcoolique



VRAI/FAUX



9/ Il est conseillé d'avoir des gants dans ses poches, en réserve.

VRAI/FAUX



Faux

Les gants risquent de se contaminer dans la poche et lors de leur manipulation.

La bonne pratique est d'avoir les gants dans leur boîte d'origine et de les enfiler au plus proche du soin.

Une organisation est à prévoir

- en posant les boites de gants (différentes tailles) sur un guéridon devant les chambres par exemple pour en avoir facilement à disposition avant d'entrer dans la chambre
- en prenant le nombre de gants nécessaire selon les gestes réalisés auprès du résident.

VRAI/FAUX



10/ Je fais une HDM au retrait des gants uniquement si je les ai porté longtemps

VRAI/FAUX



Faux

Il faut toujours procéder à une Hygiène des mains (HDM) dès le retrait des gants même en cas de geste court. Les gants donnent un faux sentiment de sécurité et augmentent le risque de contamination de l'environnement (la tenue, les surfaces..).

En cas de geste long, nos mains sont encore plus contaminées car :

- notre flore cutanée s'est multipliée sur nos mains avec l'humidité et la chaleur (sueur),
- les gants peuvent se percer (micro perforations) et devenir poreux

VRAI/FAUX



11/ Le retrait des gants se fait toujours avant le retrait du tablier à usage unique

VRAI



lors du retrait des EPI il est primordial de ne pas se contaminer (visage), ni sa tenue, ni l'environnement.

Il faut d'abord ôter les EPI les plus contaminés :

les gants puis le tablier +/- surblouse

Ne toucher avec nos mains nues que les zones non contaminées, agir doucement.

Réaliser une hygiène des mains dès le retrait des EPI.

VRAI/FAUX



12/ Je porte un tablier plastique pour accompagner un résident aux WC uniquement s'il est porteur d'une BHRe ou d'une BMR.

VRAI/FAUX



Faux

Le port du tablier à usage unique est recommandé pour tout soin souillant ou mouillant ou à risque de projection de produit biologique sur sa tenue.

Le tablier est un des EPI préconisé dans le cadre des Précautions Standard (PS) qui permettent de se protéger contre tous les micro organismes

VRAI/FAUX



13/ En cas de risque de projections de liquide biologique, j'utilise une visière ou des lunettes de protection sauf si je porte des lunettes de vue.

VRAI/FAUX



Faux

Les lunettes de vue ne sont pas un EPI,
Même si elles sont larges, elles ne sont pas assez
couvrantes pour protéger des projections autour et dans les
yeux



VRAI/FAUX



14/ Pour faire un test rapide à orientation diagnostique (TROD) par prélèvement naso-pharyngé, il faut porter :

- Une protection de la tenue : tablier / surblouse
- Un masque chirurgical type II
- Des gants vinyle
- Des lunettes de protection ou visière
- Des surchaussures

VRAI/FAUX



Pour faire un TROD par prélèvement naso-pharyngé, il faut :

- Une protection de la tenue tablier ou surblouse **vrai**
- un masque chirurgical type II **faux**
- des gants **vrai**
- des lunettes de protection ou visière **vrai**
- des surchaussures **faux**
- Un masque FFP2 **vrai**

VRAI/FAUX



15/ Une projection de liquide biologique dans l'oeil est un AES, je dois rincer abondamment l'oeil au sérum physiologique ou à l'eau pendant

1 - 1 minute

2 - 5 minutes

3 - 10 minutes

VRAI/FAUX



Une projection de liquide biologique dans l'oeil est un AES, je dois rincer abondamment l'oeil au sérum physiologique ou à l'eau pendant

2 - 5 minutes vrai

VRAI/FAUX



Vrai

16/ En cas d'épisode de gastro entérite dans l'établissement je vérifie si le détergent désinfectant (dD) que j'utilise :

- Répond à la norme de virucidie NF 14476
- Est bien dilué pour répondre à cette norme
- A un temps d'action compatible avec son utilisation

VRAI/FAUX



16/ En cas d'épisode de gastro entérite dans l'établissement je vérifie si le dD que j'utilise :

- Répond à la norme de virucidie NF 14476 **Vrai**
- Est bien dilué pour répondre à cette norme **Vrai**
- A un temps d'action compatible avec l'utilisation **Vrai**

Le CPIAS / mon RTH peut me confirmer ces éléments si j'ai besoin d'être conforté sur les données techniques du produit et de son utilisation

VRAI/FAUX



17/ Un résident présente un épisode de diarrhée dans son lit :

- J'évacue immédiatement les draps souillés
- Je procède au nettoyage-désinfection du matelas
- Je remets du linge propre en place

VRAI/FAUX



17/ Un résident présente un épisode de diarrhée dans son lit :

- J'évacue immédiatement les draps souillés
- Je procède au nettoyage-désinfection du matelas
- Je remets du linge propre en place

VRAI/FAUX



Vrai

17/ Un résident présente un épisode de diarrhée au lit :

- J'évacue les draps souillés sans dépose intermédiaire
- Je procède au nettoyage-désinfection du matelas
- Je remets du linge propre en place

Il est indispensable de vérifier l'état de la housse de matelas en la nettoyant-désinfectant lors de la réfection du lit .

Les housses deviennent poreuses ce qui entraîne une contamination de la mousse du matelas

VRAI/FAUX



J'ai prévu les animations de la semaine dans mon établissement mais il y a quelques cas d'infections respiratoires Aïgues (IRA) parmi les résidents, je peux maintenir les activités de

- chorale
- gymnastique avec frite de piscine et balle en mousse
- cinéma
- Atelier peinture
- Goûter avec ces pâtisseries
- Loto



VRAI/FAUX



J'ai prévu les animations de la semaine dans mon établissement mais il y a quelques cas d'infections respiratoires Aïgues (IRA) parmi les résidents, je peux maintenir les activités de

- chorale **Faux**
- gymnastique avec frite de piscine et balle en mousse **Faux**
- cinéma **Vrai**
- Atelier peinture **Vrai**
- Goûter avec ces pâtisseries **Faux**
- Loto **Vrai**



VRAI/FAUX



- **il y a quelques cas de Gastro Entérites Aigues Aïgues (GEA) parmi les résidents. J'organise un après midi « loto », je prévois :**

Un petit groupe de participants

Des Cartes et jetons plastifiés

Une distanciation entre personnes

Une aération après le loto

Une FHA pour les résidents et le personnel avant/après

Un bionettoyage des surfaces

Une prise de température/résidents avant la séance

VRAI/FAUX



- il y a quelques cas de Gastro Entérites Aigues Aïgues (GEA) parmi les résidents. J'organise un après midi « loto », je prévois :

| | |
|--|------|
| Un petit groupe de participants | Vrai |
| Des Cartes et jetons plastifiés | Vrai |
| Une distanciation entre personnes | Vrai |
| Une aération après le loto | Vrai |
| Une FHA pour résidents et personnel avant/après | Vrai |
| Un bionettoyage des surfaces après la séance | Vrai |
| Une prise de température/résidents avant la séance | faux |

VRAI/FAUX

Vrai

Nous vous remercions de votre participation